

ΑΣΚΗΣΕΙΣ, 6η σειρά

Επισκόπηση

Έχοντας μελετήσει τη σχετική θεωρία θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει τις παρακάτω βασικές έννοιες:

1. Διανυσματικός χώρος, διανυσματικός υπόχωρος
2. Γραμμική εξάρτηση/ανεξαρτησία διανυσμάτων
3. Βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου
4. Ευθύ άθροισμα υποχώρων διανυσματικού χώρου

Συνοψίζοντας: Αν $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ είναι διανύσματα του διανυσματικού χώρου X ,

- ◆ Το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών των \mathbf{u}_k δηλαδή το

$$\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$$

είναι υπόχωρος του X .

- ◆ Οι παρακάτω εκφράσεις είναι ισοδύναμες

(α) Τα διανύσματα είναι **γραμμικά εξαρτημένα**.

(β) Κάποιο από τα διανύσματα αυτά εκφράζεται ως γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων.

(γ) Υπάρχουν σταθερές c_1, c_2, \dots, c_n με μία τουλάχιστον από αυτές διάφορη του μηδενός, ώστε

$$c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n = \mathbf{0}.$$

- ◆ Οι παρακάτω εκφράσεις είναι ισοδύναμες

(α) Τα διανύσματα είναι **γραμμικά ανεξάρτητα**.

(β) Δεν υπάρχει \mathbf{u}_k που να εκφράζεται ως γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων.

(γ) Αν για τις σταθερές c_1, c_2, \dots, c_n ισχύει

$$c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n = \mathbf{0},$$

τότε $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

- ◆ Τα διανύσματα $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ αποτελούν μια βάση του X **αν και μόνο αν**

(α) Τα διανύσματα είναι **γραμμικά ανεξάρτητα** και

(β) $X = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$

- ◆ Αν $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ είναι μια βάση του X , τότε $\dim X = n$. Κάθε βάση του X περιέχει **ακριβώς** n διανύσματα.

- ◆ Αν V και W είναι υπόχωροι του X , τότε

(α) $Y = V + W$ είναι υπόχωρος του X , όπου $Y \subseteq X$.

(β) Αν **επιπλέον** $V \cap W = \emptyset$, τότε $Y = V \oplus W$.

Ασκήσεις

1. Έστω X ένας διανυσματικός χώρος και V και W υπόχωροι του X .

(α) Δείξτε ότι το $V \cap W$ είναι υπόχωρος του X .

(β) Ορίζουμε το **άθροισμα**

$$V + W = \{v + w : v \in V \text{ και } w \in W\}.$$

Δείξτε ότι το $V + W$ είναι υπόχωρος του X .

2. Εξηγήστε γιατί τα διανύσματα

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

δεν αποτελούν βάση για τον \mathbb{R}^3 . Στη συνέχεια βρείτε το $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$.

3. Δείξτε ότι το σύνολο των διανυσμάτων $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ είναι μια βάση για τον \mathbb{P}_n . Συμπεράνατε ότι $\dim \mathbb{P}_n = n + 1$.

4. Έστω \mathbb{P}_3^* το σύνολο των πολυωνύμων του \mathbb{P}_3 με μηδενικό σταθερό όρο, $\mathbb{P}_3^* = \{p \in \mathbb{P}_3 : p(0) = 0\}$.

(α) Δείξτε ότι το \mathbb{P}_3^* είναι υπόχωρος του \mathbb{P}_3 .

(β) Να βρεθεί μια βάση για τον \mathbb{P}_3^* .

5. Εάν τα διανύσματα $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ κάποιου διανυσματικού χώρου X είναι γραμμικά ανεξάρτητα, εξετάστε ως προς την ανεξαρτησία τα διανύσματα

(α) $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$.

(β) $\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_3, \mathbf{w}_2 = \mathbf{u}_3 - \mathbf{u}_1, \mathbf{w}_3 = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2$.

6. Έστω V ο υπόχωρος του $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ που παράγεται από τα διανύσματα $\mathbf{v}_1 = \cos^2 x, \mathbf{v}_2 = \sin^2 x$, και $\mathbf{v}_3 = \cos 2x$.

(α) Δείξτε ότι το $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ δεν είναι βάση για τον V .

(β) Να βρεθεί μια βάση για τον V .

7. Να βρεθούν βάσεις για κάθε έναν υπόχωρο των διανυσμάτων $(x \ y \ z)^T$ του \mathbb{R}^3 για τον οποίο

(α) $x = y = z$.

(β) $ax + by + cz = 0$, όπου a, b, c είναι πραγματικές σταθερές με $a \neq 0$.

8. Έστω ότι W είναι υπόχωρος του πεπερασμένης διάστασης διανυσματικού χώρου X , και έστω $\mathcal{B}_W = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ να είναι μια βάση για τον W . Αποδείξτε ότι η \mathcal{B}_W μπορεί να εμπλουτισθεί με στοιχεία $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ του X ώστε το $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ να είναι μια βάση για τον X , βλέπε Παράδειγμα 5/Δ3.

9. Έστω

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2x + y \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}.$$

Δείξτε ότι

(α) Το V με τις πράξεις του \mathbb{R}^3 αποτελεί υπόχωρο του \mathbb{R}^3 .

(β) $\dim V = 2$.

(γ) Να βρεθεί υπόχωρος W του \mathbb{R}^3 , ώστε $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.

(δ) Ποια είναι η διάσταση του W , ($\dim W = ;$).

(ε) Είναι ο W ο μοναδικός υπόχωρος για τον οποίο $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.

Λύση της 2

Τρία διανύσματα στον \mathbb{R}^3 αποτελούν βάση αν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Παρατηρούμε ότι

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_3 \quad (1)$$

δηλαδή το \mathbf{u}_3 εκφράζεται ως γραμμικός συνδυασμός των \mathbf{u}_1 και \mathbf{u}_2 , συνεπώς τα τρία διανύσματα είναι γραμμικά εξαρτημένα, συνεπώς δεν αποτελούν βάση για τον \mathbb{R}^3 .

Αν $V = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$, συνέπεια της (1), και επειδή τα \mathbf{u}_1 και \mathbf{u}_3 είναι γραμμικά ανεξάρτητα (γιατί:), είναι

$$V = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\} = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3\}.$$


Έτσι αν $\mathbf{v} \in V$ τότε υπάρχουν σταθερές r, s ώστε $\mathbf{v} = r\mathbf{u}_1 + s\mathbf{u}_3$, ισοδύναμα

$$\mathbf{v} = r \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ r \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ r \\ s \end{pmatrix}$$

κατά συνέπεια

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a \\ b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Παρατήρηση. Η γεωμετρική εικόνα του V είναι το επίπεδο (διδιάστατος υπόχωρος του \mathbb{R}^3) που περιέχει την ευθεία $y = x$, του xy -επιπέδου και τον z -άξονα.



$$V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V = W \oplus Z, \quad \text{όπου}$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad Z = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Λύση της 3

Σχόλιο

Τα πολυώνυμα είναι συναρτήσεις f, g, p, q, \dots και μια συνάρτηση, συνήθως, δηλώνεται με τον τύπο της δηλαδή με την τιμή της $f(x), g(x), p(x), q(x), \dots$ σε κάθε x του πεδίου ορισμού της. Έτσι θα έπρεπε να γράψουμε $\mathcal{B} = \{p_0, p_1, p_2, \dots, p_n\}$ όπου $p_0(x) = 1, p_k(x) = x^k, k = 1, 2, \dots, n$. Αντ' αυτού, για οικονομία, γράφουμε κατευθείαν τις τιμές των πολυωνύμων, $p_0, p_1, p_2, \dots, p_n$ στην αναγραφή των στοιχείων του \mathcal{B} .

(α) $\mathbb{P}_n = \text{span } \mathcal{B}$.

Κάθε στοιχείο του \mathcal{B} είναι στοιχείο του \mathbb{P}_n κατά συνέπεια το \mathcal{B} είναι υπόχωρος του \mathbb{P}_n , ειδικά $\text{span } \mathcal{B} \subseteq \mathbb{P}_n$. Αν p είναι ένα τυχαίο πολυώνυμο βαθμού το πολύ n ($p \in \mathbb{P}_n$) τότε

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (2)$$

είναι δηλαδή το p γραμμικός συνδυασμός των στοιχείων του \mathcal{B} , κατά συνέπεια $p \in \text{span } \mathcal{B}$, ισοδύναμα $\mathbb{P}_n \subseteq \text{span } \mathcal{B}$. Έτσι τελικά $\mathbb{P}_n = \text{span } \mathcal{B}$.

(β) Τα στοιχεία του \mathcal{B} είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

Ας υποθέσουμε ότι για σταθερές $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$ ισχύει¹

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n = 0, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Το αριστερό μέλος της εξίσωσης στην (3) είναι ένα πολυώνυμο του \mathbb{P}_n , έστω q και η σχέση (3) εκφράζει το γεγονός ότι το q μηδενίζεται για όλες τις τιμές της μεταβλητής x , ειδικά για περισσότερες τιμές απ' ότι το πλήθος των ριζών του, κατά συνέπεια το q είναι ταυτοτικά ίσο με μηδέν, ισοδύναμα² $c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0$. Κατά συνέπεια τα πολυώνυμα-διανύσματα $1, x, x^2, \dots, x^n$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

Από τα (α') και (β') έπεται ότι το \mathcal{B} είναι μια βάση για τον \mathbb{P}_n .

¹Η (3) είναι συνέπεια της

$$c_0p_0 + c_1p_1 + c_2p_2 + \dots + c_np_n = 0$$

όπου το 0 στο δεξί μέλος είναι το μηδενικό πολυώνυμο-διάνυσμα.

²Αν r_1, r_2, \dots, r_n είναι οι ρίζες του q , τότε για κάποια σταθερά c ισχύει

$$q(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n = c(x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n),$$

έτσι για $x \neq r_1, r_2, \dots, r_n$ το δεξί μέλος, άρα και το q , είναι διάφορο του μηδενός, εκτός αν $c = 0$. Εκτελώντας τις πράξεις στο δεξί μέλος της ισότητας και εξισώνοντας στη συνέχεια τους συντελεστές των ισοβάθμιων όρων προκύπτουν οι εκφράσεις των συντελεστών c_k μέσω των ριζών r_k (σχέσεις ριζών-συντελεστών, ή σχέσεις του Vieta). Ειδικά κάθε c_k είναι της μορφής c επί μια έκφραση των r_1, r_2, \dots, r_n , ισοδύναμα

$$c_k = ch_k(r_1, r_2, \dots, r_n), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Λύση της 4

(α) Αρκεί να δείξουμε ότι αν $p, q \in \mathbb{P}_3^*$ και λ, μ είναι σταθερές, τότε $\lambda p + \mu q \in \mathbb{P}_3^*$.

Αν $p, q \in \mathbb{P}_3^*$, λ, μ είναι σταθερές και $h = \lambda p + \mu q$, τότε

$$h(0) = \lambda p(0) + \mu q(0) = 0$$

αφού από την υπόθεση $p(0) = q(0) = 0$, άρα $\lambda p + \mu q \in \mathbb{P}_3^*$, ισοδύναμα το \mathbb{P}_3^* είναι υπόχωρος του \mathbb{P}_3^* .

(β) Το πολυώνυμο $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ περιέχεται στο \mathbb{P}_3^* αν και μόνο αν

$$p(0) = 0 \Leftrightarrow a_0 = 0 \Leftrightarrow p(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3,$$

κατά συνέπεια κάθε πολυώνυμο του \mathbb{P}_3^* είναι γραμμικός συνδυασμός των x, x^2, x^3 , ισοδύναμα

$$\mathbb{P}_3^* = \text{span}\{x, x^2, x^3\}.$$

Επειδή τα x, x^2, x^3 είναι γραμμικά ανεξάρτητα, βλέπε Άσκηση 2, έπεται ότι μια βάση για τον \mathbb{P}_3^* είναι η

$$\mathcal{B}_3^* = \{x, x^2, x^3\}.$$

Λύση της 5

(α) Αν c_1, c_2, c_3 είναι σταθερές ώστε $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, τότε από τον ορισμό των \mathbf{v}_k υπολογίζουμε

$$\begin{aligned}c_1(\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3) + c_2(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_3) + c_3(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) &= \mathbf{0} \\(c_2 + c_3)\mathbf{u}_1 + (c_3 + c_1)\mathbf{u}_2 + (c_1 + c_2)\mathbf{u}_3 &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

από όπου έπεται ότι

$$c_2 + c_3 = c_3 + c_1 = c_1 + c_2 = 0 \quad (4)$$

αφού τα $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Προσθέτοντας τις τρεις εξισώσεις προκύπτει

$$2c_1 + 2c_2 + 2c_3 = 0 \Rightarrow c_1 + c_2 + c_3 = 0 \quad (5)$$

Από τις (5) και (4) έπεται ότι $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, συνεπώς τα $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

(β) Αν c_1, c_2, c_3 είναι σταθερές ώστε $c_1\mathbf{w}_1 + c_2\mathbf{w}_2 + c_3\mathbf{w}_3 = \mathbf{0}$, τότε από τον ορισμό των \mathbf{w}_k υπολογίζουμε

$$\begin{aligned}c_1(\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_3) + c_2(\mathbf{u}_3 - \mathbf{u}_1) + c_3(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) &= \mathbf{0} \\(c_3 - c_2)\mathbf{u}_1 + (c_1 - c_3)\mathbf{u}_2 + (c_2 - c_1)\mathbf{u}_3 &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

από όπου, λόγω γραμμικής ανεξαρτησίας των $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$, έπεται ότι

$$c_3 - c_2 = c_1 - c_3 = c_2 - c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3. \quad (6)$$

Έτσι για $c_1 = c_2 = c_3 = 1$ έχουμε

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_3 = \mathbf{0}$$

(αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να έχουμε παρατηρήσει). Κατά συνέπεια τα $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3$ είναι γραμμικά εξαρτημένα.

Λύση της 6

(α) Από τους τύπους του διπλασίου τόξου έχουμε

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \Rightarrow \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2,$$

συνεπώς τα διανύσματα είναι γραμμικά εξαρτημένα, άρα δεν αποτελούν βάση.

(β) Από το (α') έχουμε

$$V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}.$$

Δείχνοντας ότι τα $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα προκύπτει άμεσα ότι το $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ είναι μια βάση για τον V . Αν τα $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ ήταν γραμμικά εξαρτημένα θα υπήρχε σταθερά λ , ώστε $\mathbf{v}_1 = \lambda \mathbf{v}_2$, ισοδύναμα

$$\cos^2 x = \lambda \sin^2 x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Για $x = \pi/4$, επειδή $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4)$, θα είχαμε ότι $\lambda = 1$, ενώ για $x = \pi$ θα είχαμε ότι $1 = 0$ το οποίο είναι αδύνατο.

Σημειώνουμε ότι καθένα από τα $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}, \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ είναι επίσης βάση για τον V .

Λύση της 7

(α) Έστω

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x = y = z \in \mathbb{R} \right\}$$

και αν $\mathbf{u} \in V$, τότε για κάποιο $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Η τελευταία ισότητα εκφράζει ότι το V είναι υπόχωρος του \mathbb{R}^3 , ως ολότητα γραμμικών συνδυασμών, και επιπλέον ότι το μονοσύνολο

$$\mathcal{B}_V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι μια βάση για τον V .

(β) Έστω

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : ax + by + cz = 0, a \neq 0 \right\}.$$

Αν $\mathbf{u} = (x \ y \ z)^T \in W$, τότε

$$ax + by + cz = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}y - \frac{c}{a}z.$$

Θέτοντας $p = -b/a$ και $q = -c/a$, έχουμε

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} py + qz \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} py \\ y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} qz \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} p \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} q \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Άρα

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} p \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} q \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Μια σχέση

$$\begin{pmatrix} p \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} q \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

δεν θα μπορούσε να συμβαίνει γιατί τότε θα είχαμε ότι $1 = \lambda 0$, κατά συνέπεια τα δύο διανύσματα είναι γραμμικά ανεξάρτητα, έτσι μια βάση για τον W είναι το

$$\mathcal{B}_W = \left\{ \begin{pmatrix} p \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} q \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Λύση της 8

Έστω $\dim X = m$, τότε $n \leq m$.

Αν $n = m$, τότε $W = X$ και η \mathcal{B}_W είναι βάση του X .

Έστω $n < m$. Τότε υπάρχει διάνυσμα $\mathbf{v} \in X$, ώστε $\mathbf{v} \notin W$. Θέτουμε $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}$ και

$$\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n, \mathbf{v}_1\}.$$

Τα $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n, \mathbf{v}_1$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα αφού τα $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα και το \mathbf{v}_1 δεν είναι γραμμικός συνδυασμός των $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$. Αν $n + 1 = m$, τότε το \mathcal{B}_1 είναι μια βάση του X . Αν $n + 1 < m$ επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και βρίσκουμε το σύνολο των γραμμικά ανεξαρτήτων διανυσμάτων

$$\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}.$$

Αν $n + 2 = m$ τελειώσαμε, αφού $\text{span } \mathcal{B}_2 = X$. Αν $n + 2 < m$ συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο ώστε να έχουμε $n + k = m$.

Λύση της 9

(α) Παρατηρούμε ότι

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 2x + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 2x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

συνεπώς

$$V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

επομένως το V , ως διάνοιγμα, είναι υπόχωρος του \mathbb{R}^3 .

(β) Επειδή τα δύο διανύσματα που παράγουν τον V στο (α') είναι γραμμικά ανεξάρτητα, αποτελούν μια βάση για τον V , κατά συνέπεια $\dim V = 2$.

(γ) Για το ερώτημα αυτό μας δείχνει το δρόμο η Άσκηση 8. Επιλέγουμε ένα διάνυσμα του \mathbb{R}^3 το οποίο δεν περιέχεται στον V . Ένα τέτοιο είναι το

$$\mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2)(0) + 0 \neq 0'$$

Έστω $W = \text{span}\{\mathbf{e}_3\}$. Δείχνουμε ότι $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.

(i) $\mathbb{R}^3 = V + W$.

Παρατηρούμε ότι

$$\mathbb{R}^3 \ni \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2x + y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z - 2x - y \end{pmatrix} \in V + W$$

άρα $\mathbb{R}^3 = V + W$.

(ii) $V \cap W = \{\mathbf{0}\}$.

Αν $(x \ y \ z)^T \in V \cap W$, τότε $z = 2x + y$ και $x = y = 0$, επομένως και $z = 0$, άρα $(x \ y \ z)^T = \mathbf{0}$.

Έτσι, τελικά, έχουμε ότι $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$. Σημειώνουμε ότι αυτό που ουσιαστικά δείξαμε είναι ότι το

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι μια βάση για τον \mathbb{R}^3 και προέκυψε εμπλουτίζοντας τη βάση του V με ένα διάνυσμα ($2+1=3$) του \mathbb{R}^3 εκτός του V .

(δ) Επειδή $W = \text{span}\{\mathbf{e}_3\}$ έπεται ότι $\dim W = 1$.

(ε) Η απάντηση είναι όχι, σύμφωνα με την Άσκηση 8. Στη θέση του \mathbf{e}_3 θα μπορούσαμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε διάνυσμα $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3 \setminus V$.

