

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί

Κερδίζει	ΠΕΤΡΑ	ΨΑΛΙΔΙ	ΧΑΡΤΙ
ΠΕΤΡΑ	Ψ	A	Ψ
ΨΑΛΙΔΙ	Ψ	Ψ	A
ΧΑΡΤΙ	A	Ψ	Ψ

Η σχέση *Κερδίζει* αναπαρίσταται από το σύνολο $\{(Π, Ψ), (Ψ, Χ), (Χ, Π)\}$. (Εκεί που γίνεται αληθής δηλαδή)

Χρησιμοποιώντας Γραφήματα



Σχέση (Relation)

Σχέση (relation) R από το σύνολο S στο σύνολο T :

Ένα υποσύνολο του $S \times T$

$$R \subseteq S \times T, (s, t) \in R,$$

το στοιχείο s *σχετίζεται με το* στοιχείο t

$$sRt$$

Αν $S = T$, οπότε $R \subseteq S^2$: Σχέση στο σύνολο S

Μητρώο Σχέσης

R σχέση ανάμεσα σε δύο σύνολα

Μητρώο της σχέσης: ορθογώνιο μητρώο με στοιχεία:

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{αν } s_i R t_j, (s_i, t_j) \in R \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Παράδειγμα

$$S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\} \quad T = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\}$$

$$R = \{(s_1, t_2), (s_2, t_1), (s_2, t_2), (s_2, t_5), (s_4, t_1), (s_4, t_4), (s_4, t_5)\} \subseteq S \times T.$$

Μητρώο της σχέσης:

		T				
S	R	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
	s_1	0	1	0	0	0
	s_2	1	1	0	0	1
	s_3	0	0	0	0	0
	s_4	1	0	0	1	1

Παράδειγμα (Διάταξη $<$ και $\leq$)

$$n < m \Leftrightarrow m - n \in \mathbf{N}$$

$$< = \{(n, m) : n, m \in \mathbf{Z}, m - n \in \mathbf{N}\} \subseteq \mathbf{Z}^2$$

$$\leq = \{(n, m) : n, m \in \mathbf{Z}, m - n \in \mathbf{N} \cup \{0\}\} \subseteq \mathbf{Z}^2$$

(α) $n \leq n$ ανακλαστική

(β) $n \leq m, m \leq n \Rightarrow n = m$ αντισυμμετρική

(γ) $n \leq m, m \leq p \Rightarrow n \leq p$ μεταβατική

Ανακλαστικότητα

R σχέση στο σύνολο S

Ανακλαστική (reflexive) σχέση:

Για κάθε $x \in S$, ισχύει $(x, x) \in R$

Ισοδύναμα: xRx .

Μη-ανακλαστική (irreflexive) σχέση:

Για κάθε $x \in S$, ισχύει $(x, x) \notin R$

Παράδειγμα

$$S = \{a, b, c\}$$

- Ανακλαστική αλλά όχι μη-ανακλαστική:

$$R_1 = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, c)\}$$

- Ούτε ανακλαστική ούτε μη-ανακλαστική:

$$R_2 = \{(a, a), (b, c), (c, c)\}$$

- Μη-ανακλαστική:

$$R_3 = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$$

Συμμετρικότητα

R σχέση στο σύνολο S .

Σχέση συμμετρική (symmetric):

Η παρουσία του (x, y) στο R συνεπάγεται και την παρουσία του (y, x) στο R , για κάθε $x, y \in R$.

$$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \quad \text{ή} \quad xRy \Rightarrow yRx$$

Αντισυμμετρικότητα

Σχέση R αντισυμμετρική (antisymmetric):

Η ταυτόχρονη παρουσία των (x, y) και (y, x) στο R , συνεπάγεται την ισότητα των x και y για κάθε $x, y \in R$.

$$(x, y) \in R \text{ και } (y, x) \in R \Rightarrow x = y$$

$$\text{ή } xRy \text{ και } yRx \Rightarrow x = y$$

Παραδείγματα

$$S = \{a, b, c\}$$

Σχέσεις:

- $R4 = \{(a, a), (b, c), (c, b)\}$:
συμμετρική
όχι αντισυμμετρική
- $R5 = \{(b, a), (a, c), (c, b)\}$:
αντισυμμετρική
όχι συμμετρική
- $R6 = \{(a, a), (c, c)\}$:
συμμετρική
αντισυμμετρική
- $R7 = \{(a, b), (a, c), (c, a)\}$:
όχι συμμετρική
όχι αντισυμμετρική

Μεταβατικότητα

R σχέση στο σύνολο S

Σχέση μεταβατική (transitive):

Η ταυτόχρονη παρουσία των (x, y) και (y, z) στο R συνεπάγεται την παρουσία του (x, z) στο R για κάθε $x, y, z \in R$.

$$(x, y) \in R \text{ και } (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$$

$$xRy \text{ και } yRz \Rightarrow xRz$$

Παράδειγμα – 1

$$S = \{a, b, c\}$$

$$R_8 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c)\}$$

- Μεταβατική σχέση
- Από το μητρώο της σχέσης

$$r_{ij} = r_{jk} = 1 \Rightarrow r_{ik} = 1$$

Παράδειγμα – 2

$$S = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

R	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	1	0	1	1
x_2	0	1	0	1
x_3	1	0	1	0
x_4	1	1	0	1

Παράδειγμα – 2

$$S = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

- Ανακλαστική
 - ΝΑΙ
- Συμμετρική
 - ΝΑΙ
- Μεταβατική
 - ΟΧΙ

R	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	1	0	1	1
x_2	0	1	0	1
x_3	1	0	1	0
x_4	1	1	0	1


$$r_{24} = 1, r_{41} = 1$$

$$r_{21} = 0$$

Καθορισμός Ιδιοτήτων από Γράφημα Σχέσης


- *Ανακλαστικότητα*: Κάθε κορυφή θα πρέπει να έχει έναν βρόχο.
- *Συμμετρία*: Αν η (x,y) είναι ακμή τότε θα και η (y,x) θα είναι ακμή.
- *Αντισυμμετρία*: Αν η (x,y) με $x \neq y$ είναι ακμή, τότε η (y,x) δεν είναι ακμή.
- *Μεταβατικότητα*: Αν (x,y) και (y,z) είναι ακμές, τότε το ίδιο ισχύει και για την (x,z) – τρίγωνο.

Παράδειγμα 1




- Ανακλαστική;
- Συμμετρική;
- Αντισυμμετρική;
- Μεταβατική;

Παράδειγμα 2




- Ανακλαστική;
- Συμμετρική;
- Αντισυμμετρική;
- Μεταβατική;

Παράδειγμα 3



- Ανακλαστική;
- Συμμετρική;
- Αντισυμμετρική;
- Μεταβατική;

Παράδειγμα 4



- Ανακλαστική;
- Συμμετρική;
- Αντισυμμετρική;
- Μεταβατική;

Παραδείγματα

Ανακλαστική
Συμμετρική
αΝτισυμμετρική
Μεταβατική

$$R_1 = \{(a, b) \mid a \leq b\} \quad \mathbf{A} \mathbf{N} \mathbf{M}$$

$$R_2 = \{(a, b) \mid a > b\} \quad \mathbf{N} \mathbf{M}$$

$$R_3 = \{(a, b) \mid a = b \text{ ή } a = -b\} \quad \mathbf{A} \mathbf{\Sigma} \mathbf{M}$$

$$R_4 = \{(a, b) \mid a = b\} \quad \mathbf{A} \mathbf{\Sigma} \mathbf{N} \mathbf{M}$$

$$R_5 = \{(a, b) \mid a = b + 1\} \quad \mathbf{N}$$

$$R_6 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\} \quad \mathbf{\Sigma}$$

Συνάρτηση

Η σχέση $f \subseteq S \times T$ ονομάζεται **συνάρτηση** (function):

- Για κάθε στοιχείο $s \in S$ υπάρχει ένα και μόνο στοιχείο $t \in T$ έτσι ώστε $(s, t) \in f$

Στα διατεταγμένα ζεύγη μιας συνάρτησης το κάθε στοιχείο του συνόλου S εμφανίζεται ακριβώς μία μόνο φορά


Συμβολισμός

$$f : S \rightarrow T, \quad f(s) = t$$

t *εικόνα* (image) του στοιχείου s κάτω από τη συνάρτηση f .

S *πεδίο ορισμού* (domain)

T *πεδίο τιμών* (range)




Παράδειγμα

$$S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$$

$$T = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\}$$

$$f = \{(s_1, t_5), (s_2, t_3), (s_3, t_2), (s_4, t_3)\} \subseteq S \times T$$



Ορισμοί

Συνάρτηση *επί* (onto):

- Για κάθε $t \in T$ υπάρχει ένα τουλάχιστον $s \in S$ έτσι ώστε $f(s) = t$

Συνάρτηση *ένα προς ένα* (one to one):

- $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$
- δύο οποιαδήποτε στοιχεία του πεδίου ορισμού δεν έχουν την ίδια εικόνα

Αν το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών είναι πεπερασμένα σύνολα με τον ίδιο ακριβώς αριθμό στοιχείων, οι έννοιες "επί" και "ένα προς ένα" ταυτίζονται

Ταυτοτική Συνάρτηση

I_A ταυτοτική συνάρτηση στο σύνολο A :

$$I_A(a) = a$$

για κάθε

$$a \in A$$

Η συνάρτηση αυτή είναι ένα προς ένα και επί

Αντίστροφη Σχέση


R σχέση από το σύνολο S στο σύνολο T

Αντίστροφη (inverse) σχέση:

$$R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$$

Αν R συμμετρική τότε $R^{-1}=?$

Η R και R^{-1} είναι συναρτήσεις;




$$R = \{(a, 3), (b, 1), (c, 2), (d, 3)\}$$

$$R^{-1} = \{(3, a), (1, b), (2, c), (3, d)\}$$

Παρόλο που η R είναι συνάρτηση, η R^{-1} δεν είναι συνάρτηση
(το στοιχείο 4 του συνόλου T δεν εμφανίζεται σε κανένα ζεύγος αλλά και το στοιχείο 3 εμφανίζεται σε δύο ζεύγη)

Η R και R^{-1} είναι συναρτήσεις;

Σχέση R



$$R = \{(1, c), (2, a), (3, b)\}$$

$$R^{-1} = \{(c, 1), (a, 2), (b, 3)\}.$$

Και οι δύο είναι συναρτήσεις.

Αντίστροφη Συνάρτησης

Η αντίστροφη σχέση μιας συνάρτησης f είναι και αυτή συνάρτηση αν και μόνο αν η f είναι ένα προς ένα και επί. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται η *αντίστροφη συνάρτηση* που συμβολίζεται με f^{-1} .

Ισχύει ότι $f^{-1}(f(x)) = x$

Σχέση Ισοδυναμίας

Θεωρούμε μία σχέση R στο σύνολο S . Η R είναι **σχέση ισοδυναμίας** (equivalence relation) $(\sim)$ αν ισχύουν οι ιδιότητες:

$$(\alpha) \ a \sim a \text{ (ανακλαστική)}$$

$$(\beta) \ a \sim b \Rightarrow b \sim a$$

(συμμετρική)

$$(\gamma) \ a \sim b, \ b \sim c \Rightarrow a \sim c$$

(μεταβατική)

για κάθε $a, b, c \in S$

Παράδειγμα – 1

- Σχέση $\sim$ στο Z ($n \in Z, n > 1$):

$$a \sim b \Leftrightarrow a - b = kn, \quad k \in Z$$

ή ισοδύναμα

$$a \sim b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{n}$$

- Δηλαδή: ο ακέραιος a σχετίζεται με τον ακέραιο b αν και μόνο αν η διαφορά τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του n ή αλλιώς αν το b είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του a δια n

Συναρτήσεις Κατακερματισμού

(Μία Εφαρμογή από του Χρόνου ☺)

Ορισμός: Μία **συνάρτηση κατακερματισμού** h αναθέτει μία θέση μνήμης $h(k)$ στην εγγραφή που έχει το k ως κλειδί.

- ❑ Μία κοινή συνάρτηση είναι η $h(k) = k \bmod m$, όπου m είναι το πλήθος των θέσεων μνήμης.

Παράδειγμα: Έστω $h(k) = k \bmod 111$. Αυτή η συνάρτηση αναθέτει τις εγγραφές των πελατών με ΑΦΜ ως κλειδιά, σε θέσεις μνήμης με τον εξής τρόπο:

$$h(064212848) = 064212848 \bmod 111 = 14$$

$$h(037149212) = 037149212 \bmod 111 = 65$$

$h(107405723) = 107405723 \bmod 111 = 14$, αλλά αφού η θέση 14 είναι ήδη πιασμένη, η εγγραφή θα ανατεθεί στην επόμενη διαθέσιμη θέση μνήμης, δηλαδή την 15.

Συναρτήσεις Κατακερματισμού

(Μία Εφαρμογή από του Χρόνου ☺)

- Οι συναρτήσεις κατακερματισμού δεν είναι 1-προς-1, αφού ο τομέας αναφοράς των κλειδιών είναι μεγαλύτερος από το πλήθος των θέσεων μνήμης. Όταν περισσότερα από ένα κλειδιά ανατίθενται στην ίδια θέση μνήμης τότε έχουμε **σύγκρουση**. Στο προηγούμενο παράδειγμα λύσαμε τη σύγκρουση αναθέτοντας το κλειδί στην πρώτη διαθέσιμη θέση.
- Για την επίλυση μίας σύγκρουσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία **συνάρτηση γραμμικής ανίχνευσης**: $h(k,i) = (h(k) + i) \bmod m$, όπου το i παίρνει τιμές από το 0 μέχρι το $m - 1$.
- Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι για επίλυση συγκρούσεων αλλά περισσότερα στο μάθημα «Δομές Δεδομένων»

Παράδειγμα – 1 (Συνέχεια)

- Σχέση ισοδυναμίας:

- $a \sim a$ αφού $a - a = 0 \cdot n$ (ανακλαστική)

- $a \sim b \Rightarrow a - b = \pi n \Rightarrow b - a = (-\pi)n \Rightarrow b \sim a$
(συμμετρική)

- $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a - b = pn$ και $b - c = qn$
 $\Rightarrow a - c = (a - b) + (b - c) = (p + q)n$
 $\Rightarrow a \sim c$ (μεταβατική)

Κλάση Ισοδυναμίας

- Σχέση ισοδυναμίας $\sim$ σε σύνολο S
- Για κάθε $a \in S$, **κλάση ισοδυναμίας** (equivalence class) του a :
 - Το υποσύνολο των στοιχείων του S με τα οποία το a σχετίζεται (είναι ισοδύναμα του a)
- Συμβολισμός: $[a] = \{x: a \sim x\}$
- Ισχύει:

$$[a] = [b] \Leftrightarrow a \sim b$$

Θεώρημα

*Αν $\sim$ είναι μία σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο S , τότε το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας που ορίζονται στο S αποτελεί **διαμέριση** του S .*

Παράδειγμα

$$a \equiv b \pmod{n}$$

- $n = 2$: Η διαφορά διαιρείται με το 2
- Είτε και οι δύο ακέραιοι είναι άρτιοι είτε και οι δύο είναι περιττοί
- Δύο κλάσεις ισοδυναμίας (διαμέριση $\mathbf{Z}$):
 - $[0] = \{..., -4, -2, 0, 2, 4, ...\}$
 - $[1] = \{..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, ...\}$
- Ισχύει $[2] = [0]$, $[3] = [1]$, $[5] = [1], \dots$
- κλάση $[0]$: όλοι οι άρτιοι αριθμοί,
- κλάση $[1]$: όλοι οι περιττοί αριθμοί

Παράδειγμα

$$a \equiv b \pmod{n}$$

- Για $n = 4$, έχουμε 4 κλάσεις ισοδυναμίας:

$$[0] = \{0, 0 \pm 1 \times 4, 0 \pm 2 \times 4, 0 \pm 3 \times 4, \dots\} = \{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$$

$$[1] = \{1, 1 \pm 1 \times 4, 1 \pm 2 \times 4, 1 \pm 3 \times 4, \dots\} = \{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$$

$$[2] = \{2, 2 \pm 1 \times 4, 2 \pm 2 \times 4, 2 \pm 3 \times 4, \dots\} = \{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$$

$$[3] = \{3, 3 \pm 1 \times 4, 3 \pm 2 \times 4, 3 \pm 3 \times 4, \dots\} = \{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$$

Θέμα 4^ο: (1,5 Μονάδες)

(29/8/2022)

Για σημεία (x,y) και (u,v) στο επίπεδο, η σχέση R έτσι ώστε $(x,y) R (u,v)$ σημαίνει ότι $x^2 + y^2 = u^2 + v^2$.

Αποδείξτε ότι η σχέση R είναι μία σχέση ισοδυναμίας. Να συζητήσετε πως αυτή η σχέση ισοδυναμίας διαμερίζει τα σημεία του επιπέδου στο (x,y) -επίπεδο.

Θέμα 8^ο: (1,5 Μονάδες)

(15/9/2017)

Έστω ότι A είναι το σύνολο των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής. Έστω η σχέση R που ορίζεται στο A ως εξής: Για κάθε x και y στο A

$$x R y \Leftrightarrow \text{ο } x \text{ είναι στο ίδιο τμήμα με τον } y$$

Να δείξετε ότι η σχέση R είναι σχέση ισοδυναμίας. Ποιες είναι οι κλάσεις ισοδυναμίας (δώστε την ιδιότητα που έχουν μιας και δεν μπορείτε να τις αναφέρετε).

Και Άλλο Θέμα...

Να δείξετε ότι η παρακάτω σχέση είναι σχέση ισοδυναμίας και να περιγράψτε τις κλάσεις ισοδυναμίας. Ορίζουμε τη σχέση P στο σύνολο $R \times R$ (το R είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών) ως εξής: για κάθε $(w, x), (y, z) \in R \times R$:

$$(w, x) P (y, z) \text{ σημαίνει ότι } w = y$$

Μία Ακόμα Άσκηση

Έστω ότι R_1 και R_2 είναι δύο σχέσεις ισοδυναμίας στο σύνολο S . Καθορίστε αν κάθε ένας από τους παρακάτω συνδυασμούς των R_1 και R_2 είναι σχέση ισοδυναμίας.

α) $R_1 \cup R_2$ και

β) $R_1 \cap R_2$ (αν είναι απαιτείται απόδειξη ενώ αν δεν είναι ένα αντιπαράδειγμα είναι αρκετό)

γ) $\overline{R_1}$ (το συμπλήρωμα του R_1 ως προς το S^2)