

Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με έκφραση στο αίμα

Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία
και άλλες λεμφοκυτταρώσεις

Διαγνωστική προσέγγιση και διαφορική διάγνωση λεμφοκυττάρωσης

Ορισμός λεμφοκυττάρωσης:

- Απόλυτη λεμφοκυττάρωση: λεμφοκύτταρα > 4000 /mm³
- Σχετική λεμφομυττάτωση: % λεμφοκ>40%, απολ. #<4000

Αξιολογούμε:

- Μορφολογία λεμφοκυττάρων,
- διάρκεια λεμφοκυττάρωσης,
- συνοδά κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα


Διαφορική διάγωση:

- Ειδικές Λοιμώξεις: τοξοπλάσμωση, λοιμώδης μονοπυρήνωση, φυματίωση, βρουκέλλωση, HIV, ηπατίτιδα, κλπ
- Αγγειίτιδα
- Πολυκλωνική Β-λεμφοκυττάρωση
- Οξεία Λεμφογενής Λευχαιμία
- Χρόνια Λεμφογενής λευχαιμία
- Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα
- Μη Hodgkin Λέμφωμα με έκφραση στο αίμα (οζώδες, από κύτταρα του μανδύα, οριακής ζώνης κλπ)


ΧΛΛ: Ορισμός – Διαγνωστικά κριτήρια

- Απόλυτη λεμφοκυττάρωση $> 4000/\mu\text{l}$
- Λεμφοκύτταρα με ώριμη ομοιόμορφη μορφολογία
- Παρουσία (συνήθως) λεμφοκυτταρικών πυρηνικών σκιών
- Απουσία συνήθως σημείων λοίμωξης ή φλεγμονής
- Υπο-γ-σφαιριναιμία και χαμηλά επίπεδα ανοσοσφαιρινών ορού
- Β-κυτταρική προέλευση των λεμφοκυττάρων
- Χαρακτηριστικός ανοσοφαινότυπος κυτταρικής επιφανείας: CD5+, CD19+, CD20+, συνέκφραση CD5/CD20 ή CD5/CD19.
- Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ασυνήθιστοι φαινότυποι σπανιότερα


Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία



XΛΛ



XΛΛ



Σήμερα πιστεύουμε ότι τα κύτταρα της ΧΛΛ μπορεί να είναι δυο υποτύπων:

- a. Με μεταλλαγμένη την IgVH περιοχή (CD38+, ZAP70+, → χειρότερη πρόγνωση)
- b. Με μεταλλαγμένη την IgVH περιοχή (CD38(-), ZAP70 (-), καλύτερη πρόγνωση)






FIGURE 1:
Origin of malignant cells
in B-CLL DC: dendritic cells.

Προέλευση του κυττάρου της ΧΛΑ



- **Naive B-λεμφοκύτταρο CD5+, CD19+, CD20+, CD23+, IgM+, IgD+ που υπάρχει στην κυκλοφορία στο πρωτογενές λεμφοζίδιο, στην οριακή ζώνη του λεμφοζιδίου**
- **Μνημονικό B-λεμφοκύτταρο CD5+, IgM+, με μεταλλαγμένη την V περιοχή**

Figure 7-46 part 2 of 2 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)



Τα κύτταρα στη Β-ΧΛΛ τυπικά εκφράζουν: CD19+, CD23+, CD5+, CD79b-, FMC7-, CD22-, surface IgM and IgD -

Παθογένεια της ΧΛΛ

- Διαταραχή (αναστολή) του μηχανισμού απόπτωσης των μνημονικών Β-λεμφοκυττάρων → αυξημένη επιβίωση των κυττάρων της ΧΛΛ και όχι αυξημένος πολλαπλασιασμός των κυττάρων
- Υπερέκφραση του αντιαποπτωτικού ογκογονιδίου Bcl-2
- Η έκφραση του Bcl-2 επηρεάζεται από κυτταροκίνες (IL-4, Interferon-γ) του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος
- Αγγειογένεση (VEGF, VEGF-Receptor)
- Μεταλλοπρωτεΐνάσες 2 και 9: ↑ σε προχωρημένα στάδια
- Ελάττωση μήκους τελομερών στα ΧΛΛ λεμφοκύτταρα: σχετίζεται με πρόοδο και εξέλιξη της νόσου
- Crosstalk κυτταρων ΧΛΛ με το μικροπεριββάλλον → κλινικές εκδηλώσεις

Διαφορική διάγνωση νοσημάτων με λεμφοκυττάρωση (WHO classification scoring System)

Δείκτης	XΛΛ	Score	Άλλες Β-Λευχαιμίες	score
s-Ig	Ασθ	1	Έντονο	0
CD5	+	1	Αρνητικό	0
CD23	+	1	Αρνητικό	0
CD79b/CD22	Ασθενής	1	Έντονο	0
FMC7	Αρνητικό	1	Θετικό	0
Σύνολο	XΛΛ=	4-5	Άλλη Β-Λ=	0-2

Προγνωστικοί Δείκτες ΧΛΛ

- **Ρυθμός διπλασιασμού λεμφοκυττάρων στο αίμα**
- **Παρουσία «Β» συμπτωμάτων**
- **Άτυπες ανοσοφαινοτυπικές εκφράσεις (CD5-)**
- **Απώλεια των βραχέων σκελών του χρ. 17 (del-17p15, p53)**
- **Σωματικές μεταλλάξεις της VH περιοχής**
- **Έκφραση ZAP-70 και CD38 (δείκτες αωρότητας)**
- **Επίπεδα sIL-2, sIL-6 και sCD23 ορού**
- **Αυξημένα επίπεδα LDH ορού**
- **Επίπεδα CRP, β2-μικροσφαιρίνης και αλβουμίνης ορού**
- **Δείκτες λεμφοκυτταρικού πολλαπλασιασμού**

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες στην ΧΛΛ διαπιστούμενες με FISH

Είδος ανωμαλίας	Συχνότητα	Επιβίωση (μήνες)
del-17p	7%	32
del-11q	17%	79
Τρισωμία 12 / 12q+	14%	114
del-13q	36%	113
Διάφορες: 3q+, 6q-, 8q+	7%	?
Φυσιολογικός καρυότυπος	19%	111

Σταδιοποίηση ΧΛΛ - Σύστημα Rai

Επίπεδο κινδύνου Στάδιο Κλινικά ευρήματα στην διάγνωση

Χαμηλό

0 Λεμφοκυττ (αίμα, μυελός)

Ενδιάμεσο

I Λεμφοκυττ + λεμφαδενοπάθεια

Ενδιάμεσο

II Λεμφοκυττ + σπληνομεγαλία ή
ηπατομεγαλία

Υψηλό

III Λεμφοκυττ + **αναιμία (Hb <11 g/dl)**

Πολύ Υψηλό

IV Λεμφοκυττ + **Θρομβοπενία**
Αιμοπετάλια < 100000/ μl

Σταδιοποίηση ΧΛΛ- σύστημα Binet

Στάδιο Κλινικά ευρήματα στην διάγνωση

- A Λεμφοκυττάρωση (αίμα + μυελό), < 3 θέσεις ψηλαφητών λεμφαδένων
- B Λεμφοκυττάρωση και **≥ 3 περιοχές** ψηλαφητών λεμφαδένων (+/- ήπαρ / σπλήν)
- C Ως άνω + **αναιμία ή θρομβοπενία**

Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία

Κλινική εικόνα

- Ασυμπτωματικός ασθενής – τυχαία διαπίστωση λεμφοκυττάρωσης
- Ασυμπτωματικός ασθενής – τυχαία διαπίστωση λεμφαδενοπάθειας
- «Β» συμπτώματα (απώλεια βάρους, πυρετός, κνησμός, εφιδρώσεις)
- Εμφάνιση με κάποια λοίμωξη – Συχνές λοιμώξεις
- Αίσθημα βάρους στην σπλήνα, σπληνομεγαλία
- Αναιμία ποικίλης βαρύτητος και αιτιολογίας
- Θρομβοπενία (+/- αιμορραγικές εκδηλώσεις)
- Λεμφαδενοπάθεια

Κλινικές Εκδηλώσεις ΧΛΛ




FIGURE 3:
Clinical manifestations in CLL.

Ενδείξεις έναρξης θεραπείας στην ΧΛΛ

- Β συμπτώματα: Κόπωση, πυρετός, εφιδρώσεις, απώλεια βάρους
- Συμπτωματική αναιμία ή θρομβοπενία
- Προχωρημένο στάδιο στην διάγνωση
- Προοδευτική αύξηση του μεγέθους λεμφαδένων (+/- συνοδά σημεία απόφραξης)
- Προοδευτική αύξηση του μεγέθους ήπατος, σπληνός
- Ταχύς χρόνος διπλασιασμού τών λεμφοκυττάρων (διπλασιασμός σε χρόνο < ή = 6 μήνες)
- Εμφάνιση αυτοάνοσων εκδηλώσεων: Αιμολυτική αναιμία ή θρομβοπενία
- Πίεση παρακείμενων σπλάγχνων από λεμφαδενικές μάζες
- Κακοί προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενή <65 ετών

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της θεραπείας

- Σταδιοποίηση κατά Binet ή Rai
- Ηλικία - κατάσταση Ικανότητας
- Προσδιορισμός συνοδών κλινικών προβλημάτων
- Προσδιορισμός προγνωστικών παραγόντων
- Προσδιορισμός Θεραπευτικού στόχου: πλήρης εκρίζωση του νοσήματος ή περιορισμός του φορτίου και των επιπλοκών της νόσου

Πρώτης γραμμής θεραπεία στη ΧΛΑ

- Μονοθεραπεία με Χλωραμβουκίλη: περιορίζεται η χρήση σε ασθενείς >70 ετών με συνοδά κλινικά προβλήματα
- Μονοθεραπεία με ανάλογα πουρινών (φλουνταραμπίνη, κλαδριμπίνη, δεοξυκομφορμισίνη)
- Νεότεροι αλκυλιούντες παράγοντες: **Bendamustine**
- Συνδυασμοί με **φλουνταραμπίνη και κυκλοφωσφαμίδη**: **FC, FCR, FCM** σε ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου ασθενείς
- Συνδυασμένη χημειοθεραπεία τύπου λεμφώματος
- Μονοκλωνικά αντισώματα: **Rituximab, Ofatumomab, Alemtuzumab**
- Τα κορτικοειδή συμπληρώνουν πολλά σχήματα
- Αυτόλογη μεταμόσχευση (τείνει να περιορίζεται)
- Άλλογενής μεταμόσχευση

Μειονεκτήματα της Φλουνταραμπίνης

- Αυτοάνοσες εκδηλώσεις και κυρίως η **αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία** (6.5%)
- Σοβαρή **ανοσοκαταστολή** (τοξική και στα T-λεμφοκύτταρα => κίνδυνος από ευκαιριακές λοιμώξεις)
- Τραυματισμός των πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων => Κακή κινητοποίηση **Stem cells**
- **Λοιμώξεις (συνηθως σοβαρές)**
- **Προσοχή:** προσαρμογή της δόσης της fluda επί νεφρικής ανεπάρκειας



Alemtuzumab (anti-CD52)

- Δέν έχει ένδειξη ως θεραπεία 1^{ης} γραμμής στήν ΧΛΛ
- Μπορεί να είναι αποδεκτό ως συντήρηση
- Ως θεραπεία 2^{ης} γραμμής: σε CLL Fludarabine refractory, σε ΧΛΛ με p53 mutation (17p-): ανταπόκριση 33-50%, κυρίως όταν δεν υπάρχει ογκώδης λεμφαδενοπάθεια


Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία

- Λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα με λεμφοκυττάρωση από μεσομεγέθη λεμφοκύτταρα με **εμφανές πυρήνιο**
- Διηθεί: Μυελό (\Rightarrow αίμα), σπλήνα (ερυθρό και λευκό πολφό), ήπαρ, λεμφαδένες
- **Σημαντική (συνήθως) λεμφοκυττάρωση**
- Ανοσοφαινότυπος (+δείκτες): surface IgM/IgD, CD19, CD20, **CD22, CD79a, CD79b, FMC7.**
- **Αρνητικά το CD23 και το CD5**
- **Καρυοτυπικά χαρακτηριστικά t(11;14) στο 20%, del 17 (p53) στο 53%, \Rightarrow πτωχή ανταπόκριση στην θεραπεία όταν υπάρχουν 11q23 ή 13q14**

Προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία



Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα (Hairy cell Leukemia - HCL)



Β-λεμφοκύτταρο
διαφορετικού σταδίου
ωρίμανσης από εκείνο
της ΧΛΛ

Ανοσοφαινότυπος

CD103++

CD22+

CD11c+, CD25+

FMC7+


CD19+, CD20+,

CD79a+, CD79b-

s-IgG, IgM, IgD, IgA

Χαρακτηριστικό λεμφοκύτταρο με προσεκβολές

Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων



Τα τριχωτά κύτταρα διηθούν: μυελό,
σπλήνα (ερυθρό πολφό), ήπαρ
(κολποειδή), λεμφαδένες, δέρμα

χρώση με Οξινη φωσφατάση, ανθεκτική
στο Τρυγικό (tartrate-resistant)

Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων

- Συχνότητα: 2% (των λεμφικών λευχαιμιών)
- Μέση ηλικία: 55 έτη, άνδρες/γυναίκες: 5/1
- Συνήθεις εκδηλώσεις:
 - Μεγάλη σπληνομεγαλία
 - Απουσία λεμφαδενοπάθειας
 - Πανκυτταροπενία με χαρακτηριστικά τριχωτά λεμφοκύτταρα, ενίοτε λίγα, μονοκυττοπενία, **σοβαρή ουδετεροπενία**, +/- θρομβοπενία
 - Συχνές Λοιμώξεις
 - Δυσχερής / αδύνατη αναρρόφηση μυελού (**dry tap**)
 - Χαρακτηριστική εικόνα στην βιοψία (fried eggs appearance)

Λευχαιμία εκ Τριχωτών Κυττάρων: Θεραπεία

- Θεραπεία εκλογής- πρώτης γραμμής:

Cladribine (2CDA, Leustatin)

Pentostatin (Nipent)

Μελέτες με προσθήκη Rituximab – ως συντήρηση, ή σε σχήματα 2^{ης} γραμμής.

Παλαιότερες θεραπείες (Σπληνεκτομή, Interferon) δέν έχουν πλέον θέση