

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ, 12η σειρά: Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα, Διαγωνοποίηση

### Επισκόπηση

1. **Ιδιοτιμή/Ιδιοδιάνυσμα.** Έστω  $A$  ένα τετραγωνικό,  $n \times n$ , μητρώο. Εάν

$$Ax = \lambda x, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{ή} \quad \lambda \in \mathbb{C} \quad \text{και} \quad x \neq 0$$

η σταθερά  $\lambda$  λέγεται **ιδιοτιμή** του  $A$  και το  $x$  **το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα**.

- Το **το χαρακτηριστικό πολυώνυμο** του  $A$  είναι το

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

Ο βαθμός του  $p$  είναι  $n$ .

- Ο σταθερός όρος του χαρακτηριστικού πολυωνύμου είναι

$$p(0) = (-1)^n \det A.$$

- Οι ιδιοτιμές του  $A$  είναι οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου.
- Αν  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ,  $m \leq n$  είναι οι ιδιοτιμές του  $A$ , τότε

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_m)^{k_m}, \quad k_1 + k_2 + \dots + k_m = n.$$

Το  $k_j$  είναι η **αλγεβρική πολλαπλότητα** της ιδιοτιμής  $\lambda_j$ .

- Αν  $\lambda$  είναι ιδιοτιμή του  $A$  ένα αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα (στο  $\lambda$ ) είναι ένα στοιχείο του μηδενόχωρου

$$\text{null}(\lambda I - A).$$

- Η διάσταση του  $\text{null}(\lambda I - A)$ ,  $\dim \text{null}(\lambda I - A)$  ορίζεται ως **γεωμετρική πολλαπλότητα** της ιδιοτιμής  $\lambda$ .

2. **Θεώρημα Cayley – Hamilton.** Αν  $p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$  είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του  $A$ , τότε  $p(A) = O$ ,

$$p(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = O.$$

3. Τα τετραγωνικά μητρώα  $A$  και  $B$  λέγονται **όμοια** αν υπάρχει αντιστρέψιμο μητρώο  $M$ , ώστε  $A = M^{-1}BM$ .

4. Το  $A$  λέγεται **διαγωνοποιήσιμο** αν είναι όμοιο με κάποιο διαγώνιο μητρώο.

5. **Θεώρημα.** Ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιμές είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αν το  $A$  έχει  $n$  γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα το  $A$  είναι διαγωνοποιήσιμο.

6. **Θεώρημα.** Εάν η γεωμετρική πολλαπλότητα κάθε ιδιοτιμής  $\lambda$  είναι ίση με την αλγεβρική πολλαπλότητα τότε το  $A$  είναι διαγωνοποιήσιμο. Στην περίπτωση αυτή αν  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  είναι οι ιδιοτιμές όπου κάθε ιδιοτιμή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με την πολλαπλότητά της, και  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  είναι τα αντίστοιχα γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα, τότε

$$A(\xi_1 \ \xi_2 \ \dots \ \xi_n) = (\lambda_1 \xi_1 \ \lambda_2 \xi_2 \ \dots \ \lambda_n \xi_n) = (\xi_1 \ \xi_2 \ \dots \ \xi_n)(\lambda_1 e_1 \ \lambda_2 e_2 \ \dots \ \lambda_n e_n) \\ \Rightarrow A = X \Lambda X^{-1}, \quad \text{όπου} \quad X = (\xi_1 \ \xi_2 \ \dots \ \xi_n).$$

## Ασκήσεις

1. Παραλλαγή της Άσκησης 22 §6.2 Strang. Δίνεται το μητρώο

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (α) Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και οι αντίστοιχοι ιδιόχωροι του  $A$ .  
(β) Διαγωνοποιήστε το  $A$ .  
(γ) Δείξτε ότι για κάθε  $n \in \mathbb{N}$  είναι

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 \end{pmatrix}.$$

2. Εάν για το τετραγωνικό μητρώο ισχύει  $A^2 = A$  και το διάνυσμα  $\mathbf{u}$  είναι ιδιοδιάνυσμα του  $A$  για την ιδιοτιμή  $\lambda$ , τί μπορεί να ειπωθεί για το  $\lambda$ ;  
3. Θεωρήστε το **μη αντιστρέψιμο** μητρώο

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

- (α) Να βρεθεί το χαρακτηριστικό πολυώνυμο  $p_A$  του  $A$ , ακριβώς, προσδιορίζοντας δηλαδή, και αριθμητικά όπου εφαρμόζεται, όλους τους συντελεστές.  
(β) Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του  $A$ .  
4. Άσκηση 15 §6.1 Strang. Κάθε μητρώο μετάθεσης  $P$ , ας πούμε  $3 \times 3$ , αφήνει το  $\mathbf{x} = (1 \ 1 \ 1)$  αμετάβλητο, κατά συνέπεια το  $\lambda = 1$  είναι ιδιοτιμή. Να βρεθούν οι υπόλοιπες ιδιοτιμές του μητρώου μετάθεσης

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Άσκηση 16 §6.1 Strang. Αποδείξτε ότι η οριζουσα μητρώου  $A$  ισούται με το γινόμενο των ιδιοτιμών του  $A$ .  
6. Άσκηση 17 §6.1 Strang. Το άθροισμα των διαγώνιων στοιχείων (το ίχνος) μητρώου ισούται με το άθροισμα των ιδιοτιμών.  
7. Να βρεθεί ένα ορθογώνιο μητρώο  $Q$  το οποίο διαγωνοποιεί το

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$