

# Μαθηματικά Ι

## Διαλέξεις 12 & 13

### Παράγωγοι Συναρτήσεων

Ε. Στεφανόπουλος


Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

11, 13, 18 Ιανουαρίου 2022

Αν η συνάρτηση  $f$  είναι ορισμένη σε κάποιο διάστημα  $(a, b)$  και  $x_0 \in (a, b)$  το πηλίκο διαφορών

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} := \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{(x_0 + \Delta x) - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (1)$$

εκφράζει τη μέση μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής  $y = f(x)$  προς την ανεξάρτητη  $x$  στο  $x_0$  καθώς αυτή μεταβάλλεται από  $x_0$  σε  $x_0 + \Delta x$ . Γεωμετρικά το πηλίκο αυτό είναι η κλίση της ευθείας δια των  $(x_0, f(x_0))$  και  $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ .



## Ορισμός

Αν  $f$  είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε κάποιο διάστημα  $(a, b)$  και  $x_0 \in (a, b)$  θα λέμε ότι η  $f$  είναι **παραγωγίσιμη** ή **διαφορίσιμη** στο  $x = x_0$  αν το όριο

$$f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

υπάρχει, είναι δηλαδή πραγματικός αριθμός. Το όριο  $f'(x_0)$  λέγεται **παράγωγος της  $f$  στο  $x_0$** . Εάν το όριο αυτό δεν υπάρχει ή είναι ίσο με  $+\infty$  ή  $-\infty$  θα λέμε ότι η  $f$  δεν είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$ .

## Θεώρημα

Αν η  $f$  είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε κάποιο διάστημα  $(a, b)$  και είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 \in (a, b)$  τότε είναι συνεχής στο  $x_0$ .

## Ορισμός (Πλευρικές παράγωγοι)

Αν  $f$  είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε κάποιο διάστημα  $(a, b)$  και  $x_0 \in (a, b)$ , η **παράγωγος από αριστερά** της  $f$  στο  $x_0$  ορίζεται να είναι το όριο

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

εφόσον αυτό υπάρχει. Όμοια η **παράγωγος από δεξιά** της  $f$  στο  $x_0$  ορίζεται να είναι το όριο

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

εφόσον αυτό υπάρχει.

- Σημειώνουμε ότι η παράγωγος της  $f$  στο  $x_0$  υπάρχει αν και μόνο αν  $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ . Αν η  $f$  ορίζεται στο κλειστό διάστημα  $[a, b]$  θα λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα αυτό αν είναι παραγωγίσιμη στο  $(a, b)$  και οι πλευρικές παράγωγοι  $f'_+(a)$  και  $f'_-(b)$  υπάρχουν, σαν πραγματικοί αριθμοί.
- Εάν μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο ενός διαστήματος  $(a, b)$  θα λέμε ότι η  $f$  είναι **παραγωγίσιμη** ή **διαφορίσιμη** στο διάστημα  $(a, b)$ . Στη περίπτωση αυτή η σχέση

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

παράγει μια νέα συνάρτηση την  $f'$  η οποία ορίζεται σε κάθε σημείο του  $(a, b)$  και λέγεται **παράγωγος της  $f$  στο  $(a, b)$** .

## Παράδειγμα

Να βρεθεί, αν αυτή υπάρχει, η παράγωγος της  $f(x) = x^2$  στο  $x = x_0$ .

Η  $f$  ορίζεται για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  οπότε διαμορφώνοντας το πηλίκο διαφορών

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{h(2x_0 + h)}{h} = 2x_0 + h$$

βλέπουμε ότι το όριο καθώς  $h \rightarrow 0$  υπάρχει και


$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x_0 + h) = 2x_0,$$

συνεπώς  $f'(x_0) = 2x_0$ .

Επειδή το  $x_0$  είναι τυχαίο συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση  $f(x) = x^2$  είναι παραγωγίσιμη σε όλο το  $\mathbb{R}$  και  $f'(x) = 2x$ , ισοδύναμα  $(x^2)' = 2x$ .

## Γεωμετρική σημασία της παραγώγου

Από τον ορισμό της παραγώγου έπεται ότι η παράγωγος  $f'(x_0)$  είναι η κλίση της εφαπτόμενης ευθείας στο σημείο  $(x_0, f(x_0))$  στο γράφημα της  $y = f(x)$ .



**Σχήμα:** Η εφαπτόμενη ευθεία στη γραφική παράσταση της  $f$  στο  $(x_0, y_0)$ , σαν όριο των ευθειών  $l_1, l_2, l_3, \dots$  με κλίσεις, αντίστοιχα,  $(y_k - y_0)/(x_k - x_0)$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$

## Γεωμετρική σημασία της παραγώγου (συνέχεια)

Έτσι αν  $(x, y)$  είναι ένα σημείο της ευθείας αυτής τότε

$$f'(x_0) = \frac{y - f(x_0)}{x - x_0}$$

κατά συνέπεια η εξίσωση της εφαπτόμενης ευθείας στο σημείο  $(x_0, f(x_0))$  είναι

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0). \quad (2)$$

### Φυσική σημασία της παραγώγου

Το πηλίκο διαφορών στην (1) είναι πηλίκο μεταβολών κατά συνέπεια εκφράζει το μέσο ρυθμό μεταβολής. Έτσι αν το όριο του πηλίκου καθώς  $\Delta x \rightarrow 0$  υπάρχει αυτό είναι ο ρυθμός μεταβολής ως προς  $x$  στο  $x_0$  της ποσότητας που περιγράφεται από τη συνάρτηση  $y = f(x)$ .



## Παράδειγμα

Η  $f(x) = \sqrt{x}$  ορίζεται για  $x \geq 0$ . Εξετάζουμε κατά πόσον η  $f$  είναι παραγωγίσιμη.

Για  $x > 0$  και  $x + h \geq 0$  υπολογίζουμε

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

έτσι

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

συνεπώς η  $f(x) = \sqrt{x}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(0, +\infty)$  και  $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$ .

Υπολογίζουμε την δεξιά παράγωγο της  $f$  στο  $x = 0$ ,  $f'_+(0)$ . Για  $h > 0$

$$\frac{\sqrt{0+h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \Rightarrow f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty.$$

Συμπέρασμα: η εφαπτόμενη ευθεία στο γράφημα της  $f$  στο  $(0,0)$  είναι κάθετη στον  $x$ -άξονα, είναι δηλαδή ο  $y$ -άξονας.

## Παράδειγμα

Δείχνουμε ότι η  $f(x) = \sin x$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  και  $f'(x) = \cos x$ .

Παρατηρούμε ότι

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cosh + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \left( \frac{\cosh - 1}{h} \right) + \cos x \frac{\sin h}{h}.$$

Τα όρια στο δεξί μέλος, καθώς  $h \rightarrow 0$ , υπάρχουν, για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , επομένως υπάρχει και αυτό στο αριστερό μέλος, κατά συνέπεια η  $\sin x$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$ . Επιπλέον

$$\begin{aligned} \sin' x &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{\cosh - 1}{h} \right) + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x. \end{aligned}$$

## Παράδειγμα

Δείχνουμε ότι η  $f(x) = \exp x = e^x$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  και  $f'(x) = e^x$ , δηλαδή  $\exp' x = \exp x$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

Για  $x$  και  $h$  στο  $\mathbb{R}$ , διαμορφώνοντας το ηλίκο διαφορών

$$\frac{\exp(x+h) - \exp x}{h} = \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \frac{e^x(e^h - 1)}{h}$$

συμπεραίνουμε, βλέπε Παράδειγμα 8.16 από τις σημειώσεις, ότι το όριο του ηλίκου διαφορών καθώς  $h \rightarrow 0$  υπάρχει και

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(x+h) - \exp x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x 1 = e^x,$$

κατά συνέπεια  $(e^x)' = e^x$ .

**Παράδειγμα 8.16.** (Σημειώσεις)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

## Παράγωγοι υψηλότερης τάξης

Ένας άλλος συμβολισμός για την παράγωγο, ο οποίος υπαγορεύεται από την (1), είναι

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Το σύμβολο αυτό για την παράγωγο εισήγαγε ο Leibniz. Αν  $y = f(x)$  γράφουμε επίσης

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} f(x).$$

• Αν η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο σημείο  $x_0$  ή σε κάποιο διάστημα και η  $f'$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$  ή σε κάποιο διάστημα την  $(f')'(x_0)$ , ή  $(f')'$  λέμε **δεύτερη παράγωγο** της  $f$  και τη συμβολίζουμε, απλούστερα, με  $f''$ . Όμοια, εφόσον αυτή υπάρχει, η  $f''' = (f'')'$  είναι η **τρίτη παράγωγος** της  $f$ . Γενικότερα η  $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$  είναι η **k-τάξης παράγωγος** της  $f$ . Ορίζουμε  $f^{(0)} = f$ . Με τον συμβολισμό του Leibniz γράφουμε για τις  $f'$ ,  $f''$ ,  $f'''$ , ...

$$\frac{df}{dx}, \quad \frac{d}{dx} \left( \frac{df}{dx} \right) = \frac{d^2 f}{dx^2}, \quad \frac{d}{dx} \left( \frac{df^2}{dx^2} \right) = \frac{d^3 f}{dx^3}, \quad \dots$$

## Θεώρημα

Εάν οι  $f$  και  $g$  είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις τότε εκεί που και οι δύο παράγωγοι υπάρχουν

- ①  $(\lambda f(x) + \mu g(x))' = \lambda f'(x) + \mu g'(x)$ , για κάθε  $\lambda$  και  $\mu$  στο  $\mathbb{R}$ .
- ②  $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ .
- ③  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ , εκεί όπου  $g(x) \neq 0$ .

## Θεώρημα (Κανόνας της αλυσίδας)

Εάν οι  $f$  και  $g$  είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις και η  $f \circ g$  ορίζεται τότε

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Θέτοντας  $y = (f \circ g)(x)$  και  $u = g(x)$  ο κανόνας της παραγώγου αποδίδεται ως

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

## Θεώρημα

Εάν οι  $f$  είναι παραγωγίσιμη και η  $f^{-1}$  υπάρχει τότε η  $f^{-1}$  είναι παραγωγίσιμη και

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

εκεί όπου  $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$ .

## Παράδειγμα

Για  $x > 0$ , από το παραπάνω θεώρημα έχουμε

$$\log' x = \frac{1}{\exp'(\log x)} = \frac{1}{\exp(\log x)} = \frac{1}{x}.$$

## Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων

$$① \frac{d}{dx} c = 0, \quad c = \text{σταθερά.}$$

$$② \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$③ \frac{d}{dx} \sin x = \cos x.$$

$$④ \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x.$$

$$⑤ \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x.$$

$$⑥ \frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x.$$

$$⑦ \frac{d}{dx} e^x = e^x.$$

$$⑧ \frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x}.$$

$$⑨ \frac{d}{dx} a^x = a^x \log a, \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

$$⑩ \frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \log a} = \frac{1}{x} \log_a e.$$

$$⑪ \frac{d}{dx} x^r = rx^{r-1}, \quad r \in \mathbb{R}, \quad x > 0.$$

$$⑫ \frac{d}{dx} x^x = x^x (\log x + 1), \quad x > 0.$$

$$⑬ \frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$⑭ \frac{d}{dx} \cos^{-1} x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$⑮ \frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$⑯ \frac{d}{dx} \cot^{-1} x = -\frac{1}{1+x^2}.$$

## Παράδειγμα

Θεωρούμε την συνάρτηση  $f(x) = \log|x|$ ,  $x \neq 0$ . Δείχνουμε ότι είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της και

$$(\log|x|)' = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0.$$

Πράγματι αν  $x > 0$ , τότε  $f(x) = \log x$  και  $f'(x) = 1/x$ .

Αν  $x < 0$ , τότε  $f(x) = \log(-x)$  οπότε η  $f$  σαν σύνθεση παραγωγισίμων συναρτήσεων είναι παραγωγίσιμη στο  $(-\infty, 0)$ , επιπλέον από τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε

$$f'(x) = (\log'(-x))(-x)' = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}.$$

Η απόδειξη του ισχυρισμού είναι πλήρης.



## Παράδειγμα

Δείχνουμε ότι

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1.$$

Η  $y = \sin^{-1} x$  ορίζεται για  $-1 \leq x \leq 1$  και είναι  $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$ . Από τον κανόνα της παραγώγου της αντίστροφης συνάρτησης παίρνουμε

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sin'(\sin^{-1} x)} = \frac{1}{\cos(\sin^{-1} x)}$$

που ορίζεται για  $\sin^{-1} x \neq \pm\pi/2$ , κατά συνέπεια για  $x \in (-1, 1)$ . Θέτοντας  $\omega = \sin^{-1} x$ , έχουμε  $x = \sin \omega$  και

$$\cos \omega = \sqrt{1 - \sin^2 \omega} = \sqrt{1 - x^2}$$

αφού  $\omega \in (-\pi/2, \pi/2)$ . Αντικαθιστώντας την έκφραση αυτή στον τύπο της παραγώγου παίρνουμε το ζητούμενο.

## Πεπλεγμένη παραγωγή

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να λύσουμε το εξής πρόβλημα: Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου  $x^2 + y^2 = 8$  στο σημείο  $(2, 2)$ . Σύμφωνα με ό,τι γνωρίζουμε πρέπει να βρούμε τη συνάρτηση  $y = f(x)$  το γράφημα της οποίας είναι το τμήμα του κύκλου που μας ενδιαφέρει (ο κύκλος δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης) και έπειτα να υπολογίσουμε την παράγωγο της  $f$  στο σημείο  $(2, 2)$  η οποία θα μας δώσει την κλίση της εφαπτόμενης ευθείας. Λύνοντας την εξίσωση ως προς  $y$  βρίσκουμε

$$y^2 = 8 - x^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{8 - x^2}$$

απ' όπου επιλέγουμε  $y = f(x) = \sqrt{8 - x^2}$  αφού για  $x = 2$  πρέπει να είναι  $y = 2$ . Έτσι βρίσκουμε

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{8 - x^2}} \quad \text{οπότε} \quad f'(2) = -1$$

οπότε η εξίσωση της εφαπτόμενης ευθείας είναι

$$y - 2 = -1(x - 2) \Rightarrow y = 4 - x.$$

## Πεπλεγμένη παραγωγή (συνέχεια)

Προσπαθώντας να γενικεύσουμε το πρόβλημα, παρατηρούμε ότι η συνάρτηση που μας ενδιαφέρει δίνεται σε **πεπλεγμένη μορφή** μέσω μιας εξίσωσης  $F(x, y) = 0$ , όπου  $F(x, y) = x^2 + y^2 - 8$ . Υποθέτοντας ότι η μεταβλητή  $y$  είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση του  $x$  σε κάποιο διάστημα γύρω από το  $x = 2$  μπορούμε να παραγωγίσουμε την εξίσωση  $x^2 + y^2 = 8$  και από τη σχέση που θα προκύψει να βρούμε την παράγωγο στο  $x = 2$ . Έτσι έχουμε

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}8 \Rightarrow 2x + 2yy' = 0 \quad (3)$$

απ' όπου για  $x = 2$  και  $y = 2$  βρίσκουμε  $4 + 4y'(2) = 0$ , δηλαδή  $y'(2) = -1$ , έτσι

$$y - 2 = -1(x - 2), \quad \text{ή} \quad y = 4 - x.$$

Σημειώνουμε ότι από την (3) μπορούμε να γράψουμε, εκεί όπου  $y \neq 0$ ,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για να υπολογίσουμε την παράγωγο, λέγεται **πεπλεγμένη παραγωγή**.

## Άσκηση

Να βρεθούν τα σημεία στο γράφημα της  $3x^2 + 4y^2 + 3xy = 24$  στα οποία η εφαπτόμενη ευθεία είναι οριζόντια.

## Άσκηση

Δείξτε ότι οι εφαπτόμενες ευθείες στα αντιδιαμετρικά σημεία της έλλειψης

$$\frac{(x-p)^2}{a^2} + \frac{(y-q)^2}{b^2} = 1$$

είναι παράλληλες. **Υπόδειξη:** Τα αντιδιαμετρικά σημεία της έλλειψης, όλα εκτός από ένα ζευγάρι, είναι τομές της ευθείας με εξίσωση  $y = m(x-p) + q$ ,  $m \in \mathbb{R}$  και της έλλειψης.

## Άσκηση

Δείξτε ότι

$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

## Θεώρημα (Θεώρημα του Rolle)

Έστω ότι η συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής στο  $[a, b]$  και παραγωγίσιμη στο  $(a, b)$ .  
Αν  $f(a) = f(b)$  τότε υπάρχει  $x_0 \in (a, b)$  ώστε  $f'(x_0) = 0$ .

## Θεώρημα (Θεώρημα μέσης τιμής (ΘΜΤ))

Έστω ότι η συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής στο  $[a, b]$  και παραγωγίσιμη στο  $(a, b)$ .  
Τότε υπάρχει  $x_0 \in (a, b)$  ώστε

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0). \quad (4)$$

## Πόρισμα

Έστω ότι η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(a, b)$  και  $f'(x) = 0$  για κάθε  $x \in (a, b)$ . Τότε η  $f$  είναι σταθερή στο  $(a, b)$ .

Σημειώνουμε ότι το αποτέλεσμα δεν ισχύει αν το διάστημα αντικατασταθεί με ένωση ξένων μεταξύ τους διαστημάτων, για παράδειγμα αν

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{αν } 0 < x < 1 \\ 2, & \text{αν } 1 < x < 2 \end{cases}$$

τότε  $f'(x) = 0$  για όλα τα  $x \in (0, 1) \cup (1, 2)$ , αλλά η  $f$  δεν είναι σταθερή!

### Πόρισμα

Αν οι συναρτήσεις  $f$  και  $g$  έχουν την ίδια παράγωγο στο  $(a, b)$ , τότε για κάποια σταθερά  $c$  είναι  $f(x) = g(x) + c$ .

### Πόρισμα

Έστω ότι η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε κάποιο διάστημα  $(a, b)$ .

- 1 Αν  $f'(x) > 0$  για κάθε  $x$ , τότε η  $f$  είναι αύξουσα στο  $(a, b)$ .
- 2 Αν  $f'(x) < 0$  για κάθε  $x$ , τότε η  $f$  είναι φθίνουσα στο  $(a, b)$ .

## Παράδειγμα

Εάν  $0 < a < b$  δείχνουμε ότι

$$\frac{b-a}{1+b^2} \leq \arctan b - \arctan a \leq \frac{b-a}{1+a^2}.$$

Η  $f(x) = \arctan x$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  οπότε

$$\arctan b - \arctan a = (b-a) \arctan' \xi = \frac{b-a}{1+\xi^2} \quad (\text{από το ΘΜΤ})$$

για κάποιο  $\xi \in (a, b)$ . Επειδή για  $0 < a < \xi < b$  είναι  $0 < a^2 < \xi^2 < b^2$  έπεται ότι

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \frac{b-a}{1+\xi^2} < \frac{b-a}{1+a^2}$$

συνδυάζοντας τις δύο σχέσεις έχουμε

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}.$$

**Άσκηση**

Εάν  $0 < a < b$  δείξτε ότι

$$1 - \frac{a}{b} < \log \frac{b}{a} < \frac{b}{a} - 1.$$

**Άσκηση**

Δείξτε ότι η εξίσωση

$$\arctan x = 1 - x$$

έχει μοναδική λύση και βρείτε ένα λογικό διάστημα το οποίο την περιέχει.



## Θεώρημα (Γενικευμένο Θεώρημα μέσης τιμής του Cauchy)

Έστω ότι οι συναρτήσεις  $f$  και  $g$  είναι συνεχείς στο  $[a, b]$  και παραγωγίσιμες στο  $(a, b)$ . Εάν  $g(a) \neq g(b)$  και οι  $f', g'$  δεν είναι ταυτόχρονα ίσες με μηδέν, τότε υπάρχει  $x_0 \in (a, b)$  ώστε

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

## Θεώρημα (Θεώρημα μέσης τιμής του Taylor)

Έστω ότι η συνάρτηση  $f^{(n)}$  είναι συνεχής στο  $[a, b]$  και παραγωγίσιμη στο  $(a, b)$ . Τότε υπάρχει  $x_0 \in (a, b)$  ώστε

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(a) + \frac{f''(a)}{2!}(b - a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b - a)^{n-1} + \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(b - a)^n. \quad (5)$$

Αν  $x$  και  $x_0$  είναι σημεία του  $(a, b)$  το ΘΜΤ γράφεται

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) \quad \text{για κάποιο } \xi \text{ μεταξύ } x \text{ και } x_0. \quad (6)$$

Ή για  $x \in (a, b)$  και  $|h|$  μικρό

$$f(x+h) = f(x) + f'(x+\delta h)h \quad \text{για κάποιο } \delta \in (0, 1). \quad (7)$$

Παρόμοια η (5) γράφεται στη μορφή

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (8)$$

όπου το  $\xi$  είναι μεταξύ  $x$  και  $x_0$ . Το πολυώνυμο

$$P_n(x) := f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \quad (9)$$

λέγεται **πολυώνυμο Taylor** βαθμού  $n$  της  $f$  στο  $x_0$ .

Έτσι η (8) μπορεί να γραφεί

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x) \quad (10)$$

όπου το **υπόλοιπο**  $R_n(x)$  στο  $x_0$  δίνεται από τη σχέση

$$R_n(x) := \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (11)$$

με το  $\xi$  να είναι μεταξύ  $x_0$  και  $x$ . Η έκφραση αυτή του υπολοίπου είναι η **μορφή του Lagrange**. Μια άλλη έκφραση για το  $R_n$  είναι η **μορφή του Cauchy**

$$R_n(x) := \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-x_0), \quad (12)$$

με το  $\xi$  να είναι μεταξύ  $x_0$  και  $x$ . Εν γένει τα  $\xi$  στις (11) και (12) είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

## Βασικό Παράδειγμα

Οι  $e^x$ ,  $\sin x$  και  $\cos x$  έχουν παραγώγους όλων των τάξεων και  $(e^x)^{(n)} = e^x$ ,

$$\frac{d^n}{dx^n} \sin x = \begin{cases} (-1)^k \sin x & n = 2k, \\ (-1)^k \cos x & n = 2k + 1, \end{cases} \quad \frac{d^n}{dx^n} \cos x = \begin{cases} (-1)^k \cos x & n = 2k, \\ (-1)^{k+1} \sin x & n = 2k + 1, \end{cases}$$

με  $k = 0, 1, 2, \dots$ . Έτσι για  $x_0 = 0$  και για κάθε  $x$  υπάρχει  $\xi$  μεταξύ  $x$  και μηδέν ώστε

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi x^{n+1}}{(n+1)!} \quad (13)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \pm \frac{\sin \xi x^{2n+2}}{(2n+2)!} \quad (14)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \pm \frac{\sin \xi x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (15)$$

για  $n = 0, 1, 2, \dots$ . Από τις σχέσεις αυτές εξαγονται διάφορα συμπεράσματα. Ας δούμε μερικά.

(1) Από την (13) για  $x = 1$  υπάρχει  $\xi$  μεταξύ μηδέν και ένα ώστε

$$e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} \quad 0 < \xi < 1.$$

Έτσι έχουμε

$$0 \leq e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) < \frac{e}{(n+1)!} \rightarrow 0$$

καθώς  $n \rightarrow \infty$  γεγονός που αποδεικνύει ότι η ακολουθία  $(a_n)_{n=1}^\infty$  με

$$a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

συγκλίνει στο  $e$ .

(2) Για  $n = 0$  και  $x \neq 0$  υπάρχει  $\xi$  μεταξύ μηδέν και  $x$  ώστε

$$\sin x = x - \frac{x^2}{2} \sin \xi \Rightarrow \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x}{2} \sin \xi$$

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| = \frac{|x|}{2} |\sin \xi| \leq \frac{|x|}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(3) Όμοια για  $n = 0$  και  $x \neq 0$  υπάρχει  $\xi$  μεταξύ μηδέν και  $x$  ώστε

$$\cos x = 1 - x \sin \xi \Rightarrow \frac{\cos x - 1}{x} = -\sin \xi$$

από όπου έπεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = -\sin 0 = 0,$$

αφού  $0 < |\xi| < |x|$  και κατά συνέπεια  $\xi \rightarrow 0$  καθώς  $x \rightarrow 0$ .


(4) Όμοια για  $n = 1$  και  $x \neq 0$  υπάρχει  $\xi$  μεταξύ μηδέν και  $x$  ώστε

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \sin \xi \Rightarrow \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2} + \frac{x}{6} \sin \xi$$

από όπου έπεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

αφού  $0 < |\xi| < |x|$  και κατά συνέπεια  $\xi \rightarrow 0$  καθώς  $x \rightarrow 0$ .



**Σχήμα:** Για μικρές τιμές του  $|x|$  είναι  $1 - \cos x \approx x^2/2$

(5) Από την (13) βλέπουμε ότι αν  $P_n$  είναι το πολυώνυμο Taylor βαθμού  $n$  για την  $e^x$ , τότε

$$P_n(x) = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!}, \quad P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

και  $e^x - P_n(x) = R_n(x)$  όπου

$$|R_n(x)| = e^\xi \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

αφού το  $\xi$  είναι μεταξύ 0 και  $x$ . Επειδή  $x^n/n! \rightarrow 0$  καθώς  $n \rightarrow \infty$ <sup>1</sup> έπεται ότι  $R_n(x) \rightarrow 0$  καθώς  $n \rightarrow \infty$ .

<sup>1</sup>Δείχνουμε ότι για  $a > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Έστω  $N$  ένας σταθερός φυσικός αριθμός τέτοιος ώστε  $N > 2a$ , τότε για  $n > N$

$$0 \leq \frac{a^n}{n!} = \frac{a}{1} \frac{a}{2} \cdots \frac{a}{N} \frac{a}{N+1} \cdots \frac{a}{n} \leq a^N \left(\frac{a}{N}\right)^{n-N} < a^N \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} = \frac{(2a)^N}{2^n}$$

απ' όπου έπεται το ζητούμενο αφού το δεξί άκρο της ανισότητας τείνει στο μηδέν καθώς  $n \rightarrow \infty$ .



οπότε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |e^x - P_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0 \Rightarrow e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x)$$

και από τη μορφή των  $P_n$  είναι λογικό να γράψουμε

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (16)$$

Το όριο των πολυωνύμων  $P_n$  καθώς  $n \rightarrow \infty$ , το άθροισμα δηλαδή όλων των όρων (άπειροι το πλήθος)  $x^n/n!$  είναι μια σειρά την οποία θα λέμε **δυναμοσειρά** (από τη μορφή των όρων) της  $e^x$  γύρω από το  $x = 0$ . Έτσι κάθε πολυώνυμο  $P_n$  είναι το μερικό άθροισμα  $S_n$  της δυναμοσειράς. Τη δυναμοσειρά τη λέμε **ανάπτυγμα Taylor** της  $e^x$  γύρω από το  $x = 0$ . Το ανάπτυγμα αυτό υπάρχει για κάθε πραγματικό αριθμό και συγκλίνει, όπως δείξαμε στο  $e^x$ . Έτσι θα λέμε ότι η δυναμοσειρά (16) **συγκλίνει** στην  $e^x$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ . Επιπλέον, από τον ορισμό της συνάρτησης  $\exp$ , έχουμε ότι  $e^x = \exp x$ .

**Άσκηση**

Χρησιμοποιώντας τις (14) και (15) και εργαζόμενοι όπως στο αποτέλεσμα του βασικού Παραδείγματος για την εκθετική συνάρτηση, δείξτε ότι

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \quad (17)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad (18)$$

για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

### Άσκηση

Η  $f(x) = \arctan x$ , έχει παραγώγους όλων των τάξεων.

(α) Δείξτε ότι

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + R_n(x)$$

για κατάλληλο  $R_n$ .

(β) Δείξτε ότι  $R_n(x) \rightarrow 0$  καθώς  $n \rightarrow \infty$  για κάθε  $-1 \leq x \leq 1$  και συμπεράνατε ότι

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \quad -1 \leq x \leq 1.$$

## Παράδειγμα

Προσεγγίζοντας τη συνάρτηση  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  με ένα πολυώνυμο Taylor 2ου βαθμού στο  $x_0 = 8$ , πόσο ακριβής είναι η προσέγγιση όταν  $7 \leq x \leq 9$ ;

Το ζητούμενο πολυώνυμο είναι το

$$P_2(x) = f(8) + \frac{f'(8)}{1!}(x-8) + \frac{f''(8)}{2!}(x-8)^2.$$

Υπολογίζουμε

$$f(x) = x^{1/3} \quad f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} \quad f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} \quad f'''(x) = \frac{10}{27}x^{-8/3}$$

$$f(8) = 2 \quad f'(8) = \frac{1}{12} \quad f''(8) = -\frac{1}{144}$$

επομένως

$$\sqrt[3]{x} \approx 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2.$$

## Παράδειγμα (συνέχεια)

Η ακρίβεια της προσέγγισης εκτιμάται από το υπόλοιπο  $R_2(x)$  αφού

$$f(x) - P_2(x) = R_2(x),$$

όπου το  $\xi$  στην έκφραση του  $R_n(x)$  είναι μεταξύ 8 και  $x$ . Εδώ είναι

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x-8)^3 = \frac{10}{27} \xi^{-8/3} \frac{(x-8)^3}{3!} = \frac{5(x-8)^3}{81\xi^{8/3}}.$$

Επειδή  $x \in [7, 9]$  είναι  $-1 \leq x - 8 \leq 1$ , ισοδύναμα  $|x - 8| \leq 1$  και  $\xi > 7$ , οπότε

$$|R_2(x)| = \left| \frac{5(x-8)^3}{81\xi^{8/3}} \right| < \frac{5 \cdot 1}{81 \cdot 7^{8/3}} < 0.0004.$$

Έτσι για κάθε  $x \in [7, 9]$  έχουμε

$$\left| \sqrt[3]{x} - \left( 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2 \right) \right| < 0.0004.$$

Αν η  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε κάποιο διάστημα  $(a, b)$  και  $x_0 \in (a, b)$ , τότε το πολυώνυμο Taylor πρώτου βαθμού στο  $x_0$

$$P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

είναι η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας στο γράφημα της  $f$  στο σημείο  $(x_0, f(x_0))$ . Αν το  $x$  είναι κοντά στο  $x_0$  από την (6) βλέπουμε ότι

$$f(x) \approx P_1(x),$$

κατά συνέπεια σε ένα διάστημα γύρω από το  $x_0$  η  $f$  προσεγγίζεται από μια γραμμική συνάρτηση. Το υπόλοιπο  $R_1(x)$  εκφράζει το σφάλμα της προσέγγισης.

### Ορισμός

Αν η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$  η συνάρτηση

$$L(x) := f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

λέγεται **γραμμικοποίηση** της  $f$  στο  $x_0$ .

Αν το  $x_0$  μεταβάλλεται κατά  $\Delta x = dx$  τότε η  $y = f(x)$  μεταβάλλεται κατά

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0).$$

Αν η  $f$  είναι παραγωγίσιμη η έκφραση  $f'(x_0) dx$  είναι μια προσέγγιση της  $\Delta f$  αφού για  $\Delta x$  μικρό είναι

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0) = f'(x_0) dx + \epsilon dx$$

και  $\epsilon \rightarrow 0$  καθώς  $\Delta x \rightarrow 0$ . Την έκφραση

$$dy = df = f'(x) dx$$

λέμε **διαφορικό** της  $f$ . Παρατηρούμε ότι το διαφορικό της  $f$  στο  $x_0$  είναι η μεταβολή της γραμμικοποίησης  $L$  κατά  $dx$  αφού

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)((x_0 + dx) - x_0) - f(x_0) \\ &= f'(x_0) dx. \end{aligned}$$

## Παράδειγμα

Η γραμμική προσέγγιση της  $f(x) = (1+x)^r$ ,  $x > -1$  και  $r \in \mathbb{R}$ , στο  $x = 0$  είναι

$$(1+x)^r \approx 1+rx, \quad x \text{ κοντά στο } 0.$$

Πράγματι  $f'(x) = r(1+x)^{r-1}$ , οπότε στο  $x = 0$  είναι

$$L(x) = f(0) + f'(0)(x-0) = 1+rx.$$

Έτσι για  $x$  κοντά στο μηδέν έχουμε

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$$

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 + (-1)x = 1 - x$$

$$\sqrt[3]{1+3x^4} \approx 1 + \frac{1}{3}3x^4 = 1+x^4$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \approx 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)(-x^2) = 1 + \frac{1}{2}x^2$$



## Η μέθοδος του Newton για την εύρεση ριζών

Έστω ότι η  $f$  είναι μια παραγωγίσιμη συνάρτηση με συνεχή παράγωγο στο διάστημα  $(a, b)$  και έστω, επιπλέον, ότι  $f'(x) \neq 0$  στο  $(a, b)$ . Αν  $a < x_1 < b$  η εφαπτόμενη ευθεία στο  $(x_1, f(x_1))$  έχει εξίσωση  $y - f(x_1) = f'(x_1)(x - x_1)$ . Επειδή  $f'(x) \neq 0$  η ευθεία αυτή τέμνει τον  $x$ -άξονα. Αν  $x_2$  είναι το σημείο τομής, τότε

$$0 - f(x_1) = f'(x_1)(x_2 - x_1) \Rightarrow x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

Όμοια η εφαπτόμενη ευθεία στο  $(x_2, f(x_2))$  τέμνει τον  $x$ -άξονα στο  $x_3$  και

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}.$$

Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία παίρνουμε μια αναδρομική ακολουθία

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Υποθέτοντας ότι η αναδρομική ακολουθία συγκλίνει σε κάποιο σημείο  $x^*$  από την συνέχεια των  $f$  και  $f'$  παίρνοντας το όριο  $n \rightarrow \infty$  στα δύο μέλη της αναδρομικής σχέσης έχουμε

$$x^* = x^* - \frac{f(x^*)}{f'(x^*)} \Rightarrow f(x^*) = 0,$$

δηλαδή η ακολουθία συγκλίνει σε μια ρίζα της εξίσωσης  $f(x) = 0$ . Κατά συνέπεια παίρνοντας το σημείο  $x_1$  κοντά σε ρίζα της εξίσωσης  $f(x) = 0$  το αναδρομικό αυτό σχήμα συγκλίνει στη ρίζα.

### Άσκηση

Να εξετασθούν ως προς τη σύγκλιση οι ακολουθίες και αν συγκλίνουν να βρεθούν τα όριά τους.

(α)  $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

(β)  $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

## Ορισμός

- Θα λέμε ότι η συνάρτηση  $f$  έχει **απόλυτο μέγιστο** στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της  $D(f)$  αν  $f(x_0) \geq f(x)$  για κάθε  $x \in D(f)$ . Ο αριθμός  $f(x_0)$  λέγεται **μέγιστη τιμή** της  $f$ . Όμοια θα λέμε ότι η  $f$  έχει **απόλυτο ελάχιστο** στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της  $D(f)$  αν  $f(x_0) \leq f(x)$  για κάθε  $x \in D(f)$  και ο αριθμός  $f(x_0)$  θα λέγεται **ελάχιστη τιμή** της  $f$ .
- Θα λέμε ότι η συνάρτηση  $f$  έχει **τοπικό μέγιστο** στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της  $D(f)$  αν υπάρχει ανοικτό διάστημα  $I$  το οποίο περιέχει το  $x_0$  και  $f(x_0) \geq f(x)$  για κάθε  $x \in I$ . Όμοια θα λέμε ότι η  $f$  έχει **τοπικό ελάχιστο** στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της  $D(f)$  αν υπάρχει ανοικτό διάστημα  $I$  το οποίο περιέχει το  $x_0$  και  $f(x_0) \leq f(x)$  για κάθε  $x \in I$ . Τα τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα της  $f$  λέγονται **τοπικά ακρότατα** της  $f$ .

## Θεώρημα (Fermat)

Εάν η συνάρτηση  $f$  έχει τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο στο  $x_0$  και η  $f'(x_0)$  υπάρχει τότε  $f'(x_0) = 0$ .

## Ορισμός

Ένα σημείο  $x_0$  στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης  $f$  λέγεται **κρίσιμο σημείο** της  $f$  αν  $f'(x_0) = 0$ , ή η  $f'(x_0)$  δεν υπάρχει.

## Θεώρημα (κριτήριο της πρώτης παραγώγου)

Έστω ότι το  $x_0$  είναι κρίσιμο σημείο της συνεχούς συνάρτησης  $f$ .

- ① Εάν η  $f'$  αλλάζει από θετική σε αρνητική στο  $x_0$ , τότε η  $f$  έχει τοπικό μέγιστο στο  $x_0$ .
- ② Εάν η  $f'$  αλλάζει από αρνητική σε θετική στο  $x_0$ , τότε η  $f$  έχει τοπικό ελάχιστο στο  $x_0$ .
- ③ Εάν η  $f'$  δεν αλλάζει πρόσημο στο  $x_0$ , τότε η  $f$  δεν έχει τοπικό ακρότατο στο  $x_0$ .

## Ορισμός

Εάν το γράφημα μιας συνάρτησης  $f$  βρίσκεται πάνω από κάθε εφαπτόμενη ευθεία (του γραφήματος) σε ένα διάστημα  $I$  θα λέγεται **κυρτή** στο  $I$ . Εάν το γράφημα της  $f$  βρίσκεται κάτω από κάθε εφαπτόμενη ευθεία (του γραφήματος) σε ένα διάστημα  $I$  θα λέγεται **κοίλη** στο  $I$ .



## Θεώρημα (Κριτήριο κυρτότητας)

Έστω ότι για την συνάρτηση  $f$  η  $f''$  υπάρχει σε κάποιο διάστημα  $I$ .


- ① Εάν  $f''(x) > 0$  για κάθε  $x \in I$ , η  $f$  είναι κυρτή στο  $I$ .
- ② Εάν  $f''(x) < 0$  για κάθε  $x \in I$ , η  $f$  είναι κοίλη στο  $I$ .

## Ορισμός

Ένα σημείο στο γράφημα μιας συνάρτησης  $f$  λέγεται **σημείο καμψής** εάν η συνάρτηση στο σημείο αυτό αλλάζει από κυρτή σε κοίλη, ή από κοίλη σε κυρτή.



**Σχήμα:** Μια κυρτή συνάρτηση  $f$ , και μια κοίλη συνάρτηση  $f$



**Σχήμα:** Η εφαπτόμενη ευθεία στη γραφική παράσταση συνάρτησης σε σημείο καμπής

## Θεώρημα (Κριτήριο της δεύτερης παραγώγου)

Έστω ότι η συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής σε κάποιο ανοιχτό διάστημα το οποίο περιέχει το σημείο  $x_0$ .

- ① Εάν  $f'(x_0) = 0$  και  $f''(x_0) > 0$  τότε η  $f$  έχει τοπικό ελάχιστο στο  $x_0$ .
- ② Εάν  $f'(x_0) = 0$  και  $f''(x_0) < 0$  τότε η  $f$  έχει τοπικό μέγιστο στο  $x_0$ .

## Παράδειγμα

Δείχνουμε ότι

$$1 - \frac{1}{x} \leq \log x \leq x - 1, \quad x > 0.$$

Θεωρούμε τις συναρτήσεις

$$f(x) = 1 - \frac{1}{x} - \log x \quad \text{και} \quad g(x) = x - 1 - \log x.$$

Οι  $f$  και  $g$  ορίζονται, είναι παραγωγίσιμες για  $x > 0$  και

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x^2} \quad \text{και} \quad g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$



## Παράδειγμα (συνέχεια)

- Αν  $x < 1$  είναι  $f'(x) > 0$  άρα η  $f$  είναι αύξουσα στο  $(0, 1)$  ενώ αν  $x > 1$  είναι  $f'(x) < 0$  οπότε η  $f$  είναι φθίνουσα στο  $(1, +\infty)$ . Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στο  $x = 1$  η  $f$  έχει **μέγιστο**, έτσι

$$f(x) \leq f(1) \Rightarrow 1 - \frac{1}{x} - \log x \leq 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x} \leq \log x, \quad (19)$$


για κάθε  $x > 0$ .

- Αν  $x < 1$  είναι  $g'(x) < 0$  άρα η  $g$  είναι φθίνουσα στο  $(0, 1)$  ενώ αν  $x > 1$  είναι  $g'(x) > 0$  οπότε η  $g$  είναι αύξουσα στο  $(1, +\infty)$ . Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στο  $x = 1$  η  $g$  έχει **ελάχιστο**, έτσι δηλαδή

$$g(x) \geq g(1) \Rightarrow x - 1 - \log x \geq 0 \Rightarrow x - 1 \geq \log x, \quad (20)$$

για κάθε  $x > 0$ .

Το ζητούμενο έπεται από τις (19) και (20).



**Σχήμα:**  $1 - \frac{1}{x} \leq \log x \leq x - 1$

## Παράδειγμα

Να βρεθεί ο ελάχιστος αριθμός  $M$  ώστε να ισχύει

$$|\cos a - \cos b| \leq M|a - b| \quad a, b \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]. \quad (21)$$

Η συνάρτηση  $\cos$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$ , οπότε για  $a \neq b$  από το Θεώρημα της μέσης τιμής έχουμε

$$\frac{\cos a - \cos b}{a - b} = \cos' x_0 = -\sin x_0$$

για κάποιο  $x_0$  στο  $[-\pi/6, \pi/6]$ . Έτσι έχουμε

$$\left| \frac{\cos a - \cos b}{a - b} \right| = |\sin x_0| \leq \max_{-\pi/6 \leq x \leq \pi/6} |\sin x| = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},$$

κατά συνέπεια η (21) ικανοποιείται για  $M = 1/2$ . Σημειώνουμε ότι η ανισότητα ισχύει για  $M = 1$ , αφού  $|\sin x_0| \leq 1$ , αλλά αυτή η τιμή του  $M$  απέχει πολύ από το να είναι η ελάχιστη δυνατή για να ισχύει η (21) στο διάστημα που μας ενδιαφέρει.

**Άσκηση**

Να βρεθεί η μέγιστη τιμή του  $a$  ώστε για κάθε  $x > 0$  να ισχύει  $\sqrt{x} \geq \log x + a$ .

**Άσκηση**

Να βρεθεί η γραφική παράσταση της συνάρτησης

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 2}.$$

**Άσκηση (Ανισότητα του Young)**

Εάν  $a$  και  $b$  είναι μη αρνητικοί αριθμοί και  $p, q > 1$  με  $1/p + 1/q = 1$  δείξτε ότι

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

**Υπόδειξη:** Εάν  $ab = 0$  η ανισότητα ισχύει. Για  $a > 0, b > 0$  θεωρήστε τη

$$f(x) = \frac{x^p}{p} + \frac{b^q}{q} - bx, \quad x > 0.$$

Για καθένα από τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1+x)}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} (1+x) = 2$$

ενώ ο αριθμητής και ο παρονομαστής, και στα δύο, τείνει στο μηδέν τα όρια είναι διαφορετικά. Αυτό το αποτέλεσμα μας λέει ότι η πράξη  $0/0$  δεν μπορεί να οριστεί, δηλαδή η μορφή  $0/0$  είναι απροσδιόριστη. Άλλες απροσδιόριστες μορφές είναι οι  $\infty/\infty$ ,  $0 \cdot \infty$ ,  $\infty - \infty$ ,  $0^0$ ,  $\infty^0$ ,  $1^\infty$ . Πράγματι τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \frac{1}{x-1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}$$

είναι της μορφής  $0 \cdot \infty$ .

## Θεώρημα (Ο κανόνας του L'Hospital)

Αν οι συναρτήσεις  $f$  και  $g$  είναι παραγωγίσιμες και  $g'(x) \neq 0$  σε κάθε σημείο ενός ανοικτού διαστήματος το οποίο περιέχει το σημείο  $x_0$ , εκτός ίσως από το ίδιο το σημείο  $x_0$  και

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad \text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty,$$

έχουμε δηλαδή απροσδιόριστη μορφή του τύπου  $0/0$  ή  $\infty/\infty$ , τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

εάν το όριο στο δεξιό μέλος υπάρχει, ή είναι  $+\infty$  ή  $-\infty$ .

Πράγματι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1.$$

Σημειώνουμε ότι το αποτέλεσμα του κανόνα του L'Hospital ισχύει αν το όριο  $x \rightarrow x_0$  αντικατασταθεί με ένα από τα όρια  $x \rightarrow x_0+$ ,  $x \rightarrow x_0-$ ,  $x \rightarrow +\infty$ ,  $x \rightarrow -\infty$ .

### Παράδειγμα

Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow 0} (2^x - 1) = 2^0 - 1 = 0, \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

ο κανόνας του L'Hospital εφαρμόζεται, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2^x - 1)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \log 2}{1} = \log 2.$$

## Παράδειγμα

Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}.$$

Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x) = \infty, \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$$

ο κανόνας του L'Hospital εφαρμόζεται, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x}$$

το οποίο είναι πάλι του τύπου  $\infty/\infty$ . Εφαρμόζοντας για άλλη μια φορά τον κανόνα του L'Hospital παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty.$$



## Άσκηση

Δείξτε ότι για κάθε  $r > 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^r} = 0.$$

## Παράδειγμα

Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x.$$

Το όριο είναι του τύπου  $0 \cdot \infty$  οπότε μπορεί να μετασχηματιστεί σε  $0 \cdot 1/0 = 0/0$  ή σε  $1/\infty \cdot \infty = \infty/\infty$ . Πράγματι

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{1/x} && \left( \frac{\infty}{\infty} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0. \end{aligned}$$

## Παράδειγμα

Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x}.$$

Το όριο είναι του τύπου  $1^\infty$ . Γράφοντας

$$(1 + \sin x)^{1/x} = e^{\log(1 + \sin x)^{1/x}} = e^{[\log(1 + \sin x)]/x}$$

βλέπουμε ότι καθώς  $x \rightarrow 0$  ο εκθέτης είναι του τύπου  $0/0$  οπότε από την συνέχεια της εκθετικής συνάρτησης  $\exp x = e^x$  έχουμε

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \exp \frac{\log(1 + \sin x)}{x} = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \sin x)}{x} \right) \\ &= \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) = \exp 1 = e, \end{aligned}$$

όπως περιμέναμε (γιατί);

**Άσκηση**

Να υπολογιστούν τα όρια

$$\textcircled{\alpha} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (e^{3x} - 5x)^{1/x}.$$

$$\textcircled{\beta} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{3x} - 5x)^{1/x}.$$

**Άσκηση**

Να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right).$$

Ας υποθέσουμε ότι η  $f$  είναι μια πραγματική συνάρτηση για την οποία ισχύει ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = r \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = s.$$

Ορίζοντας τις ακολουθίες  $a_n = f(n)$  και  $b_n = f(1/n)$ , επίσης ισχύει ότι

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = r \quad \text{και} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = s.$$

Έτσι αν ο κανόνας του L' Hospital εφαρμόζεται στη συνεχή περίπτωση, δηλαδή στην ανάλογη συνάρτηση  $f$  και δίνει το όριο της συνάρτησης, τότε αυτό το όριο είναι και το όριο της ακολουθίας. Για παράδειγμα

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{n} = 1.$$

Βέβαια η απόδειξη της ενδιάμεσης ισότητας δεν γίνεται με εφαρμογή του κανόνα του L' Hospital. Κάτι τέτοιο **δεν έχει έννοια σε ακολουθίες** (γιατί;).

## Παράδειγμα

Να βρεθεί το όριο της ακολουθίας  $a_n = n(e^{1/n} - 1)$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$

Γράφοντας

$$a_n = \frac{e^{1/n} - 1}{1/n}$$

βλέπουμε ότι το όριο της  $a_n$  είναι το

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x},$$

εφόσον αυτό υπάρχει. Το τελευταίο όριο είναι η παράγωγος της εκθετικής συνάρτησης στο  $x = 0$ , επομένως

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{1/n} - 1}{1/n} = e^0 = 1.$$

## Παράδειγμα

Να βρεθεί το όριο της ακολουθίας

$$a_n = \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Τα ανάλογα όρια της συνεχούς περίπτωσης είναι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)^x, \quad \text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \sin x\right)^{1/x}.$$

Και τα δύο όρια είναι της μορφής  $1^\infty$ . Στο Παράδειγμα 41, κάνοντας χρήση του κανόνα του L' Hospital υπολογίσαμε το δεύτερο όριο και δείξαμε ότι ισούται με  $e$ . Έτσι λοιπόν έχουμε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \sin x\right)^{1/x} = e.$$

## Παράδειγμα

Να βρεθεί το όριο της ακολουθίας

$$a_n = \left( \frac{\log(n+1)}{n^p} \right)^q, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

όπου  $p$  και  $q$  είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί.

Εξετάζουμε πρώτα αν το όριο

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n+1)}{n^p}$$

υπάρχει. Θεωρώντας τη συνεχή περίπτωση με  $x$  στη θέση του  $n$  βλέπουμε ότι το όριο είναι της μορφής  $\infty/\infty$ , και ότι ο αριθμητής  $\log(x+1)$  και ο παρονομαστής  $x^p$  είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις, έτσι από τον κανόνα του L' Hospital παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x+1)}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/(x+1)}{px^{p-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{px^{p-1}(x+1)}.$$

## Παράδειγμα (συνέχεια)

Αν  $p \geq 1$  το παραπάνω όριο είναι ίσο με μηδέν, ενώ αν  $0 < p < 1$  έχουμε για  $x > 0$

$$0 \leq \frac{1}{px^{p-1}(x+1)} \leq \frac{1}{px^{p-1}x} = \frac{1}{px^p}.$$

Το δεξί μέλος της ανισότητας τείνει στο 0 καθώς  $x \rightarrow +\infty$ , αφού  $p > 0$ , έτσι τελικά έχουμε για  $0 < p < 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x+1)}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{px^{p-1}(x+1)} = 0.$$

Έτσι τελικά και σε συνδυασμό με τη συνέχεια της εκθετικής συνάρτησης  $f(x) = a^x$ ,  $a > 0$  παίρνουμε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\log(n+1)}{n^p} \right)^q = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n+1)}{n^p} \right)^q = 0^q = 0.$$